

---

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **Alfaxin 50 - 100**

### **Desvenlafaxina 50 - 100 mg**

### **Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA ARCHIVADA.



#### **Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

#### **Contenido de la información para el paciente**

- 1. QUÉ ES ALFAXIN 50 - 100 Y PARA QUÉ SE UTILIZA**
- 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR ALFAXIN 50 - 100**
- 3. CÓMO USAR ALFAXIN 50 - 100**
- 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**
- 5. CONSERVACIÓN DE ALFAXIN 50 - 100**
- 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

#### **1. QUÉ ES ALFAXIN 50 - 100 Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

**Alfaxin 50 - 100** contiene Desvenlafaxina como principio activo, un antidepresivo que pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina (IRSN). Este grupo de medicamentos se utiliza para tratar la depresión. Las personas con depresión pueden presentar niveles bajos de serotonina y noradrenalina (también conocida como norepinefrina) en el cerebro. No se conoce completamente cómo funcionan los antidepresivos, pero pueden ayudar a aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina en el cerebro. **Alfaxin 50 - 100** es un tratamiento para adultos.

#### **2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR ALFAXIN 50 - 100**

**No tome Alfaxin 50 - 100 si:**

- si es alérgico a Desvenlafaxina, a venlafaxina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- si también está tomando o ha tomado durante los últimos 14 días, algún medicamento conocido como inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO) utilizado para tratar la depresión, infecciones o la enfermedad de Parkinson. Tomar un IMAO (por ejemplo linezolid o azul de

---

metileno) junto con otros medicamentos como **Alfaxin 50 - 100**, puede producir efectos adversos graves o incluso potencialmente mortales. Además, debe esperar al menos 7 días una vez que deje de tomar **Alfaxin 50 - 100** antes de tomar cualquier IMAO.

**Tenga especial cuidado con Alfaxin 50 - 100**

Consulte a su médico si ha padecido alguno de los siguientes trastornos antes de tomar **Alfaxin 50 - 100** o si aparecen durante el tratamiento con **Alfaxin 50 - 100**:

- si usted o alguien de su familia tiene antecedentes o ha tenido manía (estado de sobreexcitación, sensación de euforia o hiperirritabilidad) o trastorno bipolar (cambios extremos del estado de ánimo, por ejemplo, paso de depresión a euforia).
- si tiene antecedentes de comportamiento agresivo.
- si tiene problemas en los ojos, tales como ciertos tipos de glaucoma (aumento de la presión en el ojo).
- si tiene antecedentes de presión arterial alta.
- si tiene antecedentes de problemas cardíacos o infarto.
- si tiene antecedentes de convulsiones o epilepsia.
- si tiene antecedentes de alteraciones hemorrágicas (tendencia a desarrollar hematomas), o si está embarazada, o si está usando antiinflamatorios no esteroideos (AINE), aspirina y otros medicamentos que puedan aumentar el riesgo de hemorragia cuando se usan al mismo tiempo que Desvenlafaxina.
- si tiene antecedentes de problemas renales.
- si tiene antecedentes de niveles bajos de sodio en la sangre (hiponatremia).
- si tiene antecedentes de colesterol elevado, o si sus niveles de colesterol aumentan.
- si padece los efectos secundarios siguientes: agitación (excitabilidad e inquietud), alteración de la consciencia, confusión, coma, palpitaciones, aumento de la presión arterial, elevación de la temperatura corporal, sudoración excesiva, falta de coordinación, espasmos musculares o rigidez, temblores, náuseas, vómitos y diarrea. Póngase en contacto con su médico inmediatamente, ya que podría estar sufriendo un cuadro denominado síndrome serotoninérgico (un trastorno que puede ser grave y, en raras ocasiones, potencialmente mortal).
- si se interrumpe el tratamiento de forma brusca pueden aparecer síntomas de discontinuación del fármaco (por ejemplo cambios de humor, irritabilidad, agitación, mareos, ansiedad, confusión, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, *tinnitus* (zumbido de oídos) y convulsiones. Por lo tanto, es importante reducir la dosis de **Alfaxin 50 - 100** gradualmente y bajo supervisión médica, siempre que usted y su médico decidan interrumpir el tratamiento.
- Algunos medicamentos del grupo al que pertenece **Alfaxin 50 - 100** (llamados ISRS / IRSN) pueden causar síntomas de disfunción sexual. En algunos casos, estos síntomas persisten después de suspender el tratamiento.

***Pensamientos suicidas y empeoramiento de su depresión o trastorno de ansiedad***

Si está deprimido y/o padece trastornos de ansiedad, en ocasiones puede haber pensado en hacerse daño o suicidarse. Estos pensamientos pueden aumentar al comenzar a tomar antidepresivos, puesto que estos medicamentos tardan tiempo en actuar, normalmente unas dos semanas, pero a veces más tiempo.

Puede tener más probabilidades de pensar de esta forma:

- Si ha tenido previamente pensamientos de suicidio o de hacerse daño.
- Si es un adulto joven. La información de los ensayos clínicos ha demostrado un aumento del riesgo de comportamiento suicida en adultos jóvenes (menos de 25 años de edad) con enfermedades psiquiátricas que se trataron con antidepresivos.

---

Si tiene pensamientos de hacerse daño o suicidarse en cualquier momento, póngase en contacto con su médico o acuda a un hospital directamente.

Puede encontrar útil contarle a un familiar o amigo cercano que está deprimido o que tiene un trastorno de ansiedad, y pedirles que lean esta “Información para el Paciente”. Podría pedirles también que le digan si piensan que su depresión o ansiedad está empeorando, o si están preocupados acerca de los cambios en su conducta.

#### ***Sequedad de boca***

Se ha informado de sequedad bucal en el 18% de pacientes tratados con Desvenlafaxina. Esto puede incrementar el riesgo de caries. Por tanto, debe tener cuidado con su higiene bucal.

#### ***Pacientes de edad avanzada***

En algunos pacientes de edad avanzada no puede descartarse una mayor sensibilidad a la Desvenlafaxina.

#### ***Niños y adolescentes***

**Alfaxin 50 - 100** no debe usarse normalmente en niños y adolescentes. Además, debe saber que, en los pacientes menores de 18 años existe un mayor riesgo de efectos adversos como intentos de suicidio, hostilidad (predominantemente agresión, comportamiento de confrontación e irritación) cuando ingieren esta clase de medicamentos. Pese a esto, el médico puede prescribir este medicamento a pacientes menores de 18 años cuando decida que es lo más conveniente para el paciente. Debe informar a su médico si se desarrollan o empeoran alguno de los síntomas enumerados anteriormente cuando estos pacientes menores de 18 años están tomando **Alfaxin 50 - 100**. Además, todavía no se han demostrado los efectos a largo plazo por lo que a la seguridad se refiere y los relativos al crecimiento, la madurez y el desarrollo cognitivo y conductual de este medicamento.

#### ***Uso de Alfaxin 50 - 100 con otros medicamentos***

Comuníquese a su médico que está utilizando o ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Es especialmente importante que informe a su médico si está tomando alguno de los medicamentos siguientes:

- inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), por ejemplo medicamentos que contienen linezolid (un antibiótico usado para tratar infecciones) y azul de metileno.
- otros medicamentos que contengan venlafaxina o Desvenlafaxina (también pueden utilizarse en el tratamiento de la depresión).
- triptanos (usados para la migraña).
- medicamentos para tratar la depresión, por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, el litio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN).
- medicamentos que contienen sibutramina (usado para la pérdida de peso).
- medicamentos para el dolor, por ejemplo los que contienen tramadol, fentanilo y sus análogos, tapentadol, meperidina, metadona (también usado para tratamiento del síndrome de abstinencia a los narcóticos y la dependencia a opiáceos) y pentazocina.
- medicamentos que contienen dextrometorfano (usado para la tos).
- productos que contienen Hierba de San Juan (también denominada “Hypericum perforatum”, un remedio natural o a base de hierbas usado para tratar la depresión leve).
- productos que contienen triptófano (usados para problemas tales como sueño y depresión).
- medicamentos que contienen ketoconazol (un medicamento utilizado para tratar las infecciones provocadas por hongos).

#### ***Síndrome serotoninérgico o reacciones parecidas al síndrome neuroléptico maligno (SNM)***

Con frecuencia rara puede producirse un trastorno denominado síndrome serotoninérgico o reacciones parecidas al SNM que pueden causar cambios importantes en el funcionamiento del

---

---

cerebro, los músculos y el sistema digestivo debido a niveles elevados de serotonina en el organismo. Este estado, potencialmente mortal, puede producirse al tomar medicamentos como **Alfaxin 50 - 100**, en particular si se toman junto con otros medicamentos mencionados anteriormente.

***Cambio de antidepresivo***

Cuando se cambia el tratamiento de otro antidepresivo a Desvenlafaxina han aparecido síntomas de discontinuación del antidepresivo inicial. Su médico puede reducirle gradualmente la dosis de su medicación antidepresiva inicial para ayudar a disminuir estos síntomas.

***Interacciones con pruebas de laboratorio***

Pueden producirse falsos positivos para algunas sustancias como fenilciclina (PCP) y anfetaminas, en análisis de orina de pacientes que están tomando o han estado tomando Desvenlafaxina, incluso varios días tras la interrupción del tratamiento.

**Uso de Alfaxin 50 - 100 con alimentos, bebidas y alcohol**

Los comprimidos de **Alfaxin 50 - 100** pueden tomarse con o sin alimentos.

Debe evitar tomar alcohol mientras está usando **Alfaxin 50 - 100**.

**Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Si toma **Alfaxin 50 - 100** en la etapa final del embarazo puede producirse un mayor riesgo de sangrado vaginal abundante poco después del parto, especialmente si tiene antecedentes de alteraciones hemorrágicas. Su médico debe saber que usted está tomando **Alfaxin 50 - 100** para poder aconsejarla. Cuando se toman durante el embarazo medicamentos similares (ISRS), se puede aumentar el riesgo de un efecto grave para el bebé denominado hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPRN), provocando que el bebé respire más rápido y se ponga morado. Estos síntomas normalmente comienzan durante las primeras 24 horas una vez que el bebé haya nacido. Si su bebé tiene estos síntomas debe ponerse inmediatamente en contacto con su médico.

Si toma **Alfaxin 50 - 100** durante el embarazo, informe a su médico, puesto que su bebé podría presentar síntomas de abstinencia cuando nazca. Estos síntomas pueden aparecer justo después del parto y pueden requerir hospitalización. Entre los síntomas se incluyen dificultad para mamar o problemas respiratorios. Si su bebé tiene éstos u otros síntomas cuando nazca y está preocupada, póngase en contacto con su médico.

La Desvenlafaxina pasa a la leche materna. Existe un riesgo de efecto para el bebé. Por tanto, no utilice **Alfaxin 50 - 100** durante el período de lactancia a menos que su médico se lo indique específicamente.

**Información importante sobre los demás componentes de Alfaxin 50 - 100**

Este medicamento contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar **Alfaxin 50 - 100**.

**Conducción de vehículos y uso de maquinarias**

**Alfaxin 50 - 100** puede causar mareos, somnolencia y visión borrosa. No conduzca ni maneje herramientas o maquinarias hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

**3. CÓMO USAR ALFAXIN 50 - 100**

Siga cuidadosamente todas las instrucciones que le dé su médico, incluso si difieren de las dadas en esta información para el paciente.

La dosis recomendada es de 50 mg una vez al día. Su médico puede aumentarle la dosis hasta 100 mg una vez al día o incluso hasta un máximo de 200 mg una vez al día en caso necesario.

---

Si tiene problemas renales, o antecedentes de problemas renales, consulte a su médico dado que puede que deba tomar una dosis diferente de **Alfaxin 50 - 100**.

#### **Modo de administración**

**Alfaxin 50 - 100** debe tomarse aproximadamente a la misma hora todos los días, junto a las comidas o alejado de las mismas. Los comprimidos deben ingerirse enteros con una cantidad suficiente de agua y no deben partirse, triturarse, masticarse ni disolverse.

#### **Si se olvidó de usar Alfaxin 50 - 100**

Si no se ha tomado una dosis, tómela en cuanto lo recuerde. Sin embargo, si ya es la hora de su siguiente dosis, omita la dosis perdida y tome únicamente una dosis, como habitualmente. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

#### **Si interrumpe el tratamiento con Alfaxin 50 - 100**

No deje de tomar **Alfaxin 50 - 100**, ni cambie la dosis, sin que se lo haya indicado su médico, aunque se encuentre mejor. Su médico preferirá reducir gradualmente la dosis de **Alfaxin 50 - 100** para evitar que se produzcan efectos adversos. Se sabe que los pacientes experimentan efectos adversos cuando dejan de tomar **Alfaxin 50 - 100**, especialmente si han tomado una dosis elevada y durante un periodo de tiempo prolongado. Algunos de estos efectos adversos son: mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad, diarrea, ansiedad, pesadillas y sudoración excesiva. Por lo tanto, la dosis debe reducirse lentamente siempre que sea posible, y bajo supervisión médica, en caso de que usted y su médico decidan interrumpir el tratamiento con **Alfaxin 50 - 100**. Si experimenta cualquiera de éstos u otros síntomas que le resulten molestos, consulte a su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico

#### **Si toma más Alfaxin 50 - 100 del que debiera**

Ante la eventualidad de haber tomado una dosis mayor a la que debiera de **Alfaxin 50-100**, contacte a su médico, concorra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna). Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, **Alfaxin 50 - 100 puede** producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Se han descrito con Desvenlafaxina los siguientes efectos adversos:

##### **Efectos adversos graves**

Si nota cualquiera de los signos siguientes comuníquese a su médico inmediatamente o acuda al hospital más cercano:

- problemas del corazón, como frecuencia cardíaca rápida, aumento de la presión arterial o dolor en el pecho.
- problemas en los ojos, como visión borrosa.
- problemas nerviosos, como mareos, entumecimiento y hormigueo, trastorno del movimiento (por ejemplo movimientos musculares involuntarios, inquietud) o convulsiones.
- problemas psiquiátricos, como hiperactividad y euforia.
- alergia a medicamentos, como erupción cutánea, hinchazón de la garganta o problemas para respirar.

##### **Posibles efectos adversos**

---

Los efectos adversos y frecuencia (probabilidad de que se produzcan) que se mencionan a continuación han sido observados en pacientes. En general, estos efectos adversos se produjeron con mayor frecuencia durante la primera semana de tratamiento.

*Muy frecuentes:* afectan a más de 1 de cada 10 pacientes.

*Frecuentes:* afectan a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes.

*Poco frecuentes:* afectan a entre 1 y 10 de cada 1000 pacientes.

*Raros:* afectan a entre 1 y 10 de cada 10000 pacientes.

*Frecuencia no conocida:* no puede estimarse la frecuencia a partir de los datos disponibles.

#### ***Trastornos del sistema inmunológico***

*Poco frecuentes:* reacción alérgica.

#### ***Trastornos del metabolismo y la nutrición***

*Frecuentes:* pérdida de apetito.

*Raras:* hiponatremia (concentración disminuida de sodio en sangre).

#### ***Trastornos psiquiátricos***

*Muy frecuentes:* insomnio.

*Frecuentes:* ansiedad, nerviosismo, ausencia de orgasmo, disminución de la libido, pesadillas.

*Poco frecuentes:* distorsión de la imagen propia y de la realidad, orgasmo anormal, síndrome de abstinencia.

*Raras:* alucinaciones, hipomanía (estado de excitación y actividad exagerada) y manía (estado de sobreexcitación, sensación de euforia o hiperirritabilidad).

#### ***Trastornos del sistema nervioso***

*Muy frecuentes:* mareos, dolor de cabeza.

*Frecuentes:* somnolencia, temblores, déficit de atención, entumecimiento y hormigueo, alteración del sentido del gusto.

*Poco frecuentes:* pérdida de conciencia.

*Raros:* convulsiones, alteraciones del movimiento (por ejemplo, movimientos musculares involuntarios, inquietud).

*Frecuencia no conocida:* síndrome serotoninérgico: caracterizado por síntomas como agitación (excitabilidad e inquietud), alteración de la conciencia, confusión, coma, palpitaciones, aumento de la presión arterial, elevación de la temperatura corporal, sudoración excesiva, falta de coordinación, espasmos musculares o rigidez, temblores, náuseas, vómitos y diarrea.

#### ***Trastornos oculares***

*Frecuentes:* dilatación de las pupilas, visión borrosa.

#### ***Trastornos del oído***

*Frecuentes:* zumbidos, sensación de vértigo.

#### ***Trastornos cardíacos***

*Frecuentes:* frecuencia cardíaca rápida, palpitaciones (sensación de latido rápido, irregular o fuerte).

#### ***Trastornos vasculares***

*Frecuentes:* sofocos.

*Poco frecuentes:* frialdad periférica, presión arterial baja al cambiar de posición.

#### ***Trastornos respiratorios***

*Frecuentes:* bostezos.

*Poco frecuentes:* hemorragias nasales.

#### ***Trastornos gastrointestinales***

*Muy frecuentes:* náuseas, sequedad de boca, estreñimiento.

*Frecuentes:* vómitos, diarrea.

---

---

### **Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo**

*Muy frecuentes:* sudoración excesiva.

*Frecuentes:* erupción cutánea.

*Poco frecuentes:* pérdida total o parcial del pelo.

*Raros:* hinchazón bajo la piel, sensibilidad a la luz.

*Frecuencia no conocida:* síndrome de Stevens - Johnson (eritema multiforme consistente en una reacción de hipersensibilización que afecta la piel y las membranas mucosas).

### **Trastornos musculoesqueléticos**

*Frecuentes:* rigidez muscular.

### **Trastornos renales y urinarios**

*Poco frecuentes:* dificultad al orinar, retención de orina, proteínas en la orina.

### **Trastornos del aparato reproductor**

*Frecuentes:* disfunción eréctil, eyaculación retardada, insuficiencia eyaculatoria.

*Poco frecuentes:* disfunción sexual, trastorno de la eyaculación.

*Frecuencia no conocida:* sangrado vaginal abundante poco después del parto (hemorragia post-parto), ver “Embarazo y lactancia”.

### **Trastornos generales**

*Frecuentes:* cansancio, debilidad, escalofríos, nerviosismo, irritabilidad.

### **Evaluaciones médicas y exámenes complementarios**

*Frecuentes:* presión arterial alta, aumento de peso, pérdida de peso

*Poco frecuentes:* aumento de los niveles de colesterol en la sangre, alteración de las pruebas hepáticas, aumento de los valores de triglicéridos, aumento de los valores de una hormona llamada prolactina.

## **5. CONSERVACIÓN DE ALFAXIN 50 - 100**

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.**

No utilice **Alfaxin 50 - 100** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

## **6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

### **Composición de Alfaxin 50-100**

El principio activo es Desvenlafaxina.

**Alfaxin 50:** cada Comprimido Recubierto de Liberación Prolongada contiene: Desvenlafaxina (como Desvenlafaxina Succinato) 50 mg. Los demás componentes son: Hipromelosa; Celulosa Microcristalina; Anhídrido Silícico Coloidal; Estearato de Magnesio; Lactosa; Opadry 85F28751 White (\*1); Surelease E-7-19010 Clear (\*2); Amarillo Ocaso F.C.F. Laca Aluminica. (\*1) Opadry 85F28751 White está compuesto por: Alcohol Polivinílico; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol; Talco.

(\*2) Surelease E-7-19010 Clear está compuesto por: Aceite de Coco; Etilcelulosa; Ácido Oleico.

**Alfaxin 100:** cada Comprimido Recubierto de Liberación Prolongada contiene: Desvenlafaxina (como Desvenlafaxina Succinato) 100 mg. Los demás componentes son: Hipromelosa; Celulosa Microcristalina; Anhídrido Silícico Coloidal; Estearato de Magnesio; Lactosa; Opadry 85F28751 White (\*1); Amarillo Ocaso F.C.F. Laca Aluminica.

(\*1) Opadry 85F28751 White está compuesto por: Alcohol Polivinílico; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol; Talco.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

---

**Alfaxin 50:** Envases conteniendo 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50 y 60 Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada, redondos, grabados con la sigla ALF en una de sus caras y el logo Bagó en la otra, color naranja,

**Alfaxin 100:** Envases conteniendo 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50 y 60 Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada, oblongos, grabados con la sigla ALF 100 en una de sus caras, color naranja.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **ALFAXIN 50 - 100** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó – Información de Productos, Dirección Médica: [infoproducto@bago.com.ar](mailto:infoproducto@bago.com.ar) – 0114344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 57.182.  
Información para el paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



*Ética al servicio de la salud*

**LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



*Ética al servicio de la salud*