

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Bagóvit A Plus **Triamcinolona Acetonida 0,1 %** **Vitamina A 100.000 U** **Crema**

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA
Uso Externo



Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

Contenido de la información para el paciente

- 1. QUÉ ES BAGÓVIT A PLUS Y PARA QUÉ SE UTILIZA**
- 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR BAGÓVIT A PLUS**
- 3. CÓMO USAR BAGÓVIT A PLUS**
- 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**
- 5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT A PLUS**
- 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

1. QUÉ ES BAGÓVIT A PLUS Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Bagóvit A Plus Crema contiene Triamcinolona Acetonida y Vitamina A con lo cual posee una acción antiinflamatoria, antialérgica, antipruriginosa, protectora y regeneradora de la piel. **Bagóvit A Plus** se utiliza para el alivio de los síntomas de la inflamación y/o el prurito (picazón) asociado a trastornos cutáneos que responden a los corticosteroides tales como dermatosis inflamatorias y dermatitis alérgicas no infectadas.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR BAGÓVIT A PLUS

No utilice Bagóvit A Plus

- Si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de la formulación.
- Si padece de infecciones tuberculosas o virósicas de la piel (como varicela o herpes simple), acné vulgar, infecciones causadas por bacterias u hongos y atrofia cutánea persistente.

- Si padece de diabetes *mellitus* y/o glaucoma (aumento de la presión ocular) está contraindicado su uso a largo plazo.

Tenga especial cuidado al utilizar Bagóvit A Plus

No aplicar en los ojos ni alrededor de los mismos.

Evitar tratamientos en superficies muy amplias, ya que puede provocar la absorción sistémica. Su utilización durante largos periodos de tiempo, así como su aplicación en el rostro deben ser controlados por el médico.

Contacte con su médico si experimenta visión borrosa u otras alteraciones visuales.

En caso de aparición de reacciones en la zona de la piel tratada, como irritación o dermatitis por hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación, se debe suspender la aplicación del producto y consultar al médico.

Niños y adolescentes

No se recomienda la utilización de este medicamento en niños ni adolescentes en crecimiento por el contenido de Triamcinolona, corticoide de potencia intermedia, salvo que a criterio del médico esté demostrada la necesidad de su utilización.

Uso de Bagóvit A Plus con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

No es probable que se produzcan interacciones farmacológicas por la aplicación tópica de **Bagóvit A Plus**. En caso de utilización inadecuada del producto (vendajes oclusivos, aplicación en grandes áreas de piel lesionada, quemaduras, etc.) pueden producirse unos niveles de absorción sistémica apreciables del corticoide, que podrían conducir a interacciones similares a las descritas a continuación para la vía oral:

- Interacción con antiinflamatorios no esteroideos: puede incrementar el riesgo de úlcera péptica y sangrados gastrointestinales. Riesgo en pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales.
- En diabéticos puede dificultar el control de la glucemia.
- La administración al mismo tiempo con diuréticos (como por ejemplo furosemida, torasemida, hidroclorotiazida), fármacos simpaticomiméticos (medicamentos usados para elevar la presión arterial) y teofilina (medicamento para el asma) aumenta el riesgo de hipopotasemia.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Embarazo

No debe utilizarse el preparado en altas dosis ni en zonas extensas durante periodos prolongados en el embarazo.

Lactancia

Se desconoce si los corticosteroides tópicos se excretan en la leche materna, por lo que si está usando este medicamento no debe amamantar a su hijo. No debe aplicarse la crema en el pecho antes de amamantar

Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinarias

No se han descrito efectos sobre la conducción y uso de maquinarias.

3. CÓMO USAR BAGÓVIT A PLUS

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Bagóvit A Plus es de uso cutáneo exclusivo.

Como esquema de orientación se aconseja:

Aplicar la crema sobre la zona lesionada haciendo un suave masaje para asegurar su mejor penetración, de 1 a 3 veces por día.

Uso en pediatría

No se recomienda la utilización de este medicamento en niños ni adolescentes en crecimiento por el contenido de Triamcinolona, corticosteroide de potencia intermedia, salvo que a criterio del médico esté demostrada la necesidad de su utilización y en este caso se aplicará una fina capa una vez al día no debiendo sobrepasar el tratamiento de dos semanas.

Los niños y adolescentes tienen una relación mayor de área cutánea con respecto al peso y una piel más fina y menos desarrollada que los adultos, por lo que la absorción de corticosteroides tópicos puede ser mayor. En niños y en adolescentes en crecimiento no se recomienda usar corticosteroides del tipo de la Triamcinolona, de potencia intermedia ni de alta o muy alta potencia salvo que esté demostrada la necesidad de su utilización.

Si se utiliza en niños, el tratamiento debe ser cuidadosamente controlado por el médico, esto es particularmente importante si el medicamento se aplica en más del 5 al 10% de la superficie corporal o si se utilizan vendajes oclusivos o un pañal muy ajustado.

Si utiliza más Bagóvit A Plus de la que debiera

Debido a que la aplicación de este medicamento es para uso cutáneo, no es probable que se produzcan cuadros de intoxicación.

El tratamiento de la sobredosis es sintomático y de mantenimiento, debiéndose suspender la aplicación del medicamento. Puede ser necesario suspenderlo gradualmente. En casos de ingestión accidental de grandes cantidades del producto, el tratamiento consiste en dilución con líquidos.

Ante la eventualidad de haberse aplicado una dosis mayor a la que debiera de **Bagóvit A Plus** contacte a su médico, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247;
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115;
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Si olvidó utilizar Bagóvit A Plus

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **Bagóvit A Plus** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en esta información para el paciente, informe a su médico.

Si usted experimenta irritación local o cualquier otro tipo de hipersensibilidad, deje de usar este medicamento y consulte con un médico inmediatamente.

Las reacciones adversas de **Bagóvit A Plus** son:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Irritación, sequedad, foliculitis (inflamación de los folículos que dan lugar a la formación del pelo), hipertrichosis (aumento del espesor del vello corporal), despigmentación (pérdida de coloración de la piel), furunculosis (foliculitis con inflamación del área periférica que puede formar un absceso), pústulas (pequeñas elevaciones de la piel llenas de pus) o formación de vesículas, más frecuente con vendajes oclusivos.

También puede producirse visión borrosa, hiperestesia (aumento de la sensibilidad), entumecimiento de los dedos de las manos, púrpura (lesiones por hemorragias de la piel) y atrofia cutánea. En la cara puede producirse agravación del acné rosácea.

5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT A PLUS

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Bagóvit A Plus

Los principios activos son Triamcinolona Acetonida 100 mg y Vitamina A (como Palmitato) 100.000 U.

Cada 100 g de Crema contiene: Triamcinolona Acetonida 100 mg, Vitamina A (como Palmitato) 100.000 U. Los demás componentes son: Edetato Disódico, Butilhidroxitolueno, Metilparabeno, Propilparabeno, Polisorbato 80, Citrato de Sodio, Ácido Cítrico, Alcohol Cetílico, Alcohol Estearílico, Vaselina Líquida, Lauriletoxissulfato de Sodio 25 %, Glicerina, Lanolina, Perfume Bouquet 22656, Agua Purificada.

Contenido del envase

Envases conteniendo 5, 15, 30, 60, 100 y 120 gramos de crema.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓVIT A PLUS** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó – Información de Productos, Dirección Médica: infoproducto@bago.com.ar – 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 15.456.

Información para el paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T: <http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



Ética al servicio de la salud

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.