

## Dioxaflex Complex

Diclofenaco Sódico 50 mg

Vitaminas B1, B6, B12

Comprímdos Recubiertos

Industria Argentina

EXPENDIO BAJO RECETA

Este Medicamento es Libre de Gluten.



### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

**Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
  - Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

**Contenido de la información para el paciente**

- **QUÉ ES DIOXAFLEX COMPLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA**
- **QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR DIOXAFLEX COMPLEX**

**CÓMO USAR DIOXAFLEX COMPLEX**

**POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

- **CONSERVACIÓN DE DIOXAFLEX COMPLEX**
- **CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

#### 1. QUÉ ES DIOXAFLEX COMPLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA

**Dioxaflex Complex** combina Diclofenaco un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), utilizado para aliviar el dolor y la inflamación junto con las vitaminas hidrosolubles del grupo B, Tiamina (Vitamina B1), Piridoxina (Vitamina B6) y Cianocobalamina (Vitamina B12), que intervienen en numerosos procesos del metabolismo humano y cumplen la función de coenzimas de importancia especial en el metabolismo de los nervios, favoreciendo la acción analgésica del Diclofenaco.

**Dioxaflex Complex** se utiliza para el tratamiento de las afecciones inflamatorias dolorosas no reumáticas con compromiso de los nervios y procesos inflamatorios musculoesqueléticos como lumbalgias (dolor lumbar), cialgia (dolor en la parte baja de la espalda, cadera y pierna), cervicalgias (dolor del cuello), poliartritis crónica (dolor e inflamación que afecta a muchas articulaciones diferentes), artrosis (enfermedad crónica degenerativa que produce la destrucción de los cartilagos de las articulaciones), espondiloartritis (enfermedad degenerativa que causa desgaste del cartilago de las articulaciones de las vértebras de la columna, en la cual puede haber compresión de los nervios espinales o raíces nerviosas, lo que resulta en dolor).

#### 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR DIOXAFLEX COMPLEX

Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie o controle el dolor y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

**No use Dioxaflex Complex si:**

- Es alérgico (hipersensible) al Diclofenaco, a la Cianocobalamina, Tiamina o Piridoxina o a cualquiera de los demás componentes del medicamento, incluyendo el cobalto.
- Tiene o ha tenido reacciones alérgicas a la aspirina u otros analgésicos (medicamentos para tratar el dolor) o antiinflamatorios similares. Las reacciones pueden incluir asma (dificultad para respirar), urticaria (reacción alérgica en la piel con aparición de ronchas y picazón), rinitis aguda (inflamación de la mucosa nasal) o hinchazón de los labios o párpados. Si cree que puede ser alérgico consulte a su médico.
- Padece actualmente una úlcera o hemorragia de estómago o intestino o ha tenido dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados relacionados con tratamientos anteriores con antiinflamatorios no esteroideos.
- Padece una enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activa (enfermedades que producen diarrea con o sin sangre y dolor abdominal).
- Padece una enfermedad cardíaca establecida y/o una enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, si ha tenido un ataque al corazón, accidente cerebrovascular (ACV), accidente isquémico transitorio (AIT) u obstrucción en los vasos sanguíneos del corazón o del cerebro, o una operación para eliminar alguna obstrucción o hacerle un bypass coronario.
- Tiene o ha tenido problemas con la circulación sanguínea (enfermedad arterial periférica).
- Padece una enfermedad grave de los riñones, del hígado o insuficiencia severa de la función del corazón no controlada.
- Presenta alteraciones en la coagulación de la sangre o está tomando medicamentos usados para evitar la formación de coágulos (anticoagulantes).
- Padece la enfermedad de Leber (enfermedad hereditaria que provoca pérdida de visión), o ambliopía tabáquica (disminución de la agudeza visual) porque podría agravarse su condición.
- Está en tratamiento con levodopa (medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson).
- Presenta psoriasis (enfermedad inflamatoria de la piel, que ocasionalmente también afecta a las articulaciones, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón de las articulaciones).
- Se encuentra embarazada o amamantando a su bebé.

**Tenga especial cuidado con Dioxaflex Complex si:**

- Ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación de estómago o de intestino pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro o incluso cursar sin síntomas previos de alerta. Este riesgo es mayor al usar dosis altas, en los ancianos y en pacientes debilitados. Consulte a su médico inmediatamente en caso de presentar algunos de estos síntomas. Su médico le puede recomendar en estos casos comenzar el tratamiento con la menor dosis efectiva y asociar un medicamento protector del estómago.
- Tiene problemas cardíacos, antecedentes de ataques cerebrales o piensa que puede tener riesgo de sufrir estas patologías (por ejemplo si tiene la presión arterial alta, insuficiencia cardíaca descompensada, trastornos en la circulación, sufre diabetes, tiene aumentado el colesterol, o es fumador) debe consultar este tratamiento con su médico, ya que los medicamentos que contienen Diclofenaco como **Dioxaflex Complex** se pueden asociar con un leve aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos ("infarto de miocardio") o cerebrales ("accidente cerebrovascular"), especialmente cuando se emplean en dosis altas y en tratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendados. Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o presión arterial elevada (hipertensión arterial). Acuda inmediatamente a su médico si presenta dolor de pecho, dificultad para respirar, debilidad, dificultad para hablar o moverse.
- Presenta alteraciones previas de la función de los riñones, insuficiencia en la función del corazón o del hígado, usa diuréticos o es de edad avanzada, ya que puede presentar mayor riesgo de efectos secundarios sobre los riñones.
- Presenta síntomas de reacciones alérgicas como dificultad para respirar o tragar, hinchazón de labios, lengua y garganta o cuerpo en general, disminución de la presión de la sangre, palpitaciones o desmayo. Debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con **Dioxaflex Complex** y contactar con su médico o acudir inmediatamente al servicio de urgencias del hospital más cercano.
- Le aparece una erupción en la piel (incluidas lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales, como ampollas, descamación o sangrado). Debe interrumpir el tratamiento con **Dioxaflex Complex** y consultar a su médico inmediatamente.
- Presenta signos clínicos y/o síntomas relacionados con enfermedad hepática (por ejemplo náuseas, vómitos, fatiga, prurito, coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos, erupción en la piel), consulte a su médico dado que el tratamiento debe ser discontinuado por precaución.
- Está tomando otros medicamentos antiinflamatorios, incluyendo aspirina, anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios del tipo de la aspirina, otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo de hemorragias como corticoides o medicamentos antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
- Presenta asma, rinitis alérgica estacional, inflamación de la mucosa nasal (es decir pólipos nasales), enfermedad pulmonar obstructiva crónica o infecciones crónicas del tracto respiratorio.
- Presenta enfermedad del hígado, o trastornos hemorrágicos u otros trastornos de la sangre incluyendo porfiria hepática (enfermedades metabólicas, generalmente hereditaria).
- Hubiese padecido con anterioridad una alergia a la Tiamina al contacto con su piel (dermatitis de contacto) por motivos profesionales, dado que podría sufrir una recaída con la administración de este medicamento.
- Tiene predisposición a padecer gota (enfermedad por depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones con dolor e inflamación) debe tener precaución porque la Cianocobalamina puede precipitar una crisis gotosa.
- Se expondrá al sol por tiempo prolongado o a lámpara de rayos ultravioleta (UVA) ya que la Piridoxina puede aumentar la sensibilidad a la luz produciendo lesiones en la piel.

Consulte a su médico si presentara alguna de las situaciones mencionadas.

**Información importante sobre los demás componentes de Dioxaflex Complex**

Este medicamento contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar **Dioxaflex Complex**.

**Uso de Dioxaflex Complex con otros medicamentos**

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta o derivados de hierbas. Ciertos medicamentos pueden interferir con **Dioxaflex Complex**, en estos casos puede ser necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de ellos.

- Es especialmente importante que informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente alguno de los siguientes medicamentos:
  - Medicamentos inhibidores de la recaptación de la serotonina (para tratar algunos tipos de depresión o ansiedad).
  - Otros medicamentos del mismo grupo del Diclofenaco, como la aspirina o el ibuprofeno o cualquier otro AINE.
  - Medicamentos anticoagulantes de administración oral (para prevenir coágulos en la sangre). Su médico deberá controlar los parámetros de coagulación cuando empiece o termine el tratamiento con **Dioxaflex Complex**.
  - Medicamentos del tipo de los corticoides (medicamentos para tratar y aliviar inflamaciones o en enfermedades autoinmunes).
  - Medicamentos que contienen metotrexato (para tratar una enfermedad denominada artritis reumatoidea y algunos tipos de cáncer).
  - Medicamentos que contienen ciclosporina, tacrolimus, azatioprina, ciclofosfamida, mercaptopurina (usados durante los trasplantes de órganos o el tratamiento de algunos tipos de cáncer), 5-fluorouracilo (para el tratamiento de algunos tipos de cáncer), colchicina (tratamiento de la gota).
  - Medicamentos para tratar problemas del corazón como amiodarona, digoxina o verapamilo; puede ser necesario que su médico controle los niveles de digoxina en la sangre.
  - Medicamentos utilizados para tratar la diabetes; su médico puede requerir controlar los niveles de glucosa en sangre.
  - Medicamentos para aumentar la cantidad de orina (diuréticos).
  - Medicamentos anticonvulsivantes (utilizados para tratar los ataques epilépticos) como el fenobarbital o la fenitoína. Si está tomando fenitoína, su médico puede requerir controlar los niveles de fenitoína en la sangre.
  - Medicamentos empleados para el tratamiento de la presión arterial elevada como beta-bloqueantes, hidralazina, isoniazida, o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA).
  - Medicamentos que contienen un antibiótico llamado trimetoprima (para prevenir y tratar enfermedades del tracto urinario u otras infecciones bacterianas).
  - Medicamentos que contienen cloranfenicol, quinolonas, ceftriaxona, neomicina (para tratar las infecciones por bacterias), voriconazol (un medicamento utilizado en el tratamiento de infecciones por hongos), isoniazida, ácido paraaminosalícico, aminosalicilatos (antibióticos empleados para el tratamiento de la tuberculosis) o penicilamina.

- Medicamentos que contienen misoprostol (para tratar las úlceras de estómago).
- Medicamentos que contienen colestiramina (para disminuir los niveles de colesterol en sangre).
- Levodopa (medicamento para el tratamiento del Parkinson).
- Anticonceptivos orales.
- Formulaciones de potasio de liberación prolongada.
- Ácido ascórbico (antioxidante), ácido fólico (usado para el tratamiento de algunas anemias).

**Uso de Dioxaflex Complex con alimentos, bebidas y alcohol**

La ingesta de bebidas alcohólicas junto con este medicamento puede aumentar su toxicidad.

**Uso en niños**

No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 12 años de edad por lo cual no debe administrarse a este grupo de pacientes.

**Uso en pacientes de edad avanzada**

Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles que el resto de adultos a las lesiones de estómago y duodeno inducidas por AINE. Además los AINE pueden causar retención de líquidos, pudiendo producir complicaciones cardiovasculares y reducción de la eficacia de los tratamientos para reducir la presión arterial. Se recomienda en estos pacientes utilizar la menor dosis efectiva.

**Fertilidad**

Las pacientes que quieren quedar embarazadas deben tener en cuenta que los medicamentos del tipo de Diclofenaco se han asociado a una disminución de la capacidad para concebir.

**Embarazo**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Debido a que la administración de medicamentos del tipo de Diclofenaco se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas / abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible. En el tercer trimestre la administración de Diclofenaco está contraindicada.

No deberá tomar **Dioxaflex Complex** si usted está amamantando, o debe suspender la lactancia si el medicamento es estrictamente necesario para la madre.

**Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinarias**

Este medicamento puede producir somnolencia, mareos o cansancio en algunos pacientes. Evitar conducir y/o utilizar máquinas durante el tratamiento con **Dioxaflex Complex**.

#### 3. CÓMO USAR DIOXAFLEX COMPLEX

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico incluso si difieren de las descritas en esta información.

**Adultos y niños mayores de 12 años**

**Tratamiento inicial:** 1 comprimido recubierto cada 8 horas.

**Dosis de mantenimiento:** por lo general es suficiente 1 comprimido recubierto cada 12 o 24 horas. No se debe exceder la dosis máxima de 3 comprimidos recubiertos por día.

En pacientes de edad avanzada debe procederse con precaución.

Los comprimidos recubiertos deben tomarse sin masticar con abundante líquido junto con las comidas.

**Si usa más Dioxaflex Complex del que debiera**

Ante la eventualidad de haberse tomado más **Dioxaflex Complex** del que debiera o ingesta accidental contacte a su médico, concorra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**Si olvidó tomar Dioxaflex Complex**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

#### 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **Dioxaflex Complex** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Informe a su médico si sufre alguno de los siguientes efectos adversos:

Los efectos adversos que se han notificado con el uso de Diclofenaco son los siguientes:

**Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):** dolor de cabeza, mareos, vértigo, náuseas, vómitos, diarreas, indigestión o sensación de acidez, dolor abdominal, flatulencia, disminución del apetito, alteraciones en los resultados de los análisis de sangre que evalúan el funcionamiento del hígado (aumento de enzimas del hígado), erupción en la piel.

**Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):** trastornos cardíacos (a dosis altas durante tratamientos prolongados) como palpitaciones, dolor en el pecho repentino (síntomas de infarto de miocardio o de un ataque al corazón), respiración entrecortada, dificultad para respirar acostado, hinchazón de pies y piernas (signos de insuficiencia cardíaca). Deje de usar **Dioxaflex Complex** y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas.

**Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):** hinchazón en la cara, ojos, o lengua, dificultad para tragar, silbidos, ronchas y picazón generalizado, erupción en la piel, fiebre, dolor abdominal, molestias u opresión en el pecho, dificultad para respirar, mareos, disminución de la presión arterial, desmayo (reacción alérgica grave). Dolor de estómago, diarrea con sangre, úlcera gástrica o intestinal con o sin sangrado o perforación (vómitos de sangre y aparición de sangre en heces), Hepatitis con o sin coloración amarillenta. Deje de usar **Dioxaflex Complex** y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas.

**Otros efectos adversos raros:** somnolencia, asma, alteración de la función del hígado, erupción de la piel (ronchas), retención de líquidos con hinchazón (edema).

**Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10000 personas):** signos o síntomas de disminución de algunos tipos de células de la sangre como cansancio, dolor de cabeza, falta de aire al hacer ejercicio, mareos, palidez (anemia), infecciones frecuentes con fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras en la boca (leucopenia), sangrados o aparición de moretones (trombocitopenia), Meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro) con síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, rigidez del cuello o sensibilidad extrema a la luz brillante. Dificultad para respirar, silbidos (neumonitis). Dolor intenso en la parte alta del abdomen, náuseas, vómitos y pérdida de apetito (signos de pancreatitis). Reacciones graves en la piel con erupción, enrojecimiento, ampollas en los labios, boca u ojos, descamación de la piel, aparición de fatiga, náuseas, pérdida de apetito, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, tos o dolor en el cuerpo (síndrome de Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica). Anomalías del funcionamiento de los riñones que provocan hinchazón en pies o piernas y disminución súbita de la cantidad de orina (insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial, necrosis papilar renal), sangre en orina (hematuria), espuma en orina (proteinuria, síndrome nefrótico). Deje de usar **Dioxaflex Complex** y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas. Otros efectos adversos muy raros: hinchazón en la cara. Desorientación, depresión, insomnio, pesadillas, irritabilidad, reacciones psicóticas (excitabilidad, alucinaciones, delirios). Sensación de hormigueo, trastornos de la memoria, convulsiones, ansiedad, temblor, trastornos del gusto, accidente cerebrovascular (ACV), Alteraciones visuales, visión borrosa, visión doble, Zumbidos en los oídos. Hipertensión (presión arterial alta), vasculitis (inflamación de las paredes de los vasos). Empeoramiento de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Constipación, hinchazón de la lengua (glositis), inflamación de la mucosa de la boca (estomatitis), problemas para tragar (alteración de la función del hígado, erupción generalizada (eczema), enrojecimiento (eritema y eritema multiforme), descamación de la piel (dermatitis exfoliativa), pérdida de cabello, alergia al sol (reacción de fotosensibilidad), aparición de moretones (púrpura), picazón.

**Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles):** cólicos abdominales leves y dolor abdominal a la palpación que comienza poco después de iniciar el tratamiento seguido de sangrado rectal o diarrea con sangre observadas normalmente dentro de las 24 horas posteriores a la aparición del dolor abdominal.

**Casos aislados**

Anomalías en el funcionamiento del hígado que provocan coloración amarillenta en piel y blanco de los ojos, fiebre, dolor abdominal y moretones (insuficiencia hepática, hepatitis fulminante, necrosis hepática). Deje de usar **Dioxaflex Complex** y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas. Los efectos adversos que se han notificado con el uso de Tiamina, Piridoxina, Cianocobalamina son los siguientes:

**Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):** dolor de cabeza, sensación de hormigueo o adormecimiento de las manos, piernas o pies, y/o alteraciones en la sensibilidad (alteraciones en el tacto), somnolencia, náuseas, vómitos, erupción en la piel, reacciones alérgicas. La administración repetida de Tiamina puede provocar recaídas en reacciones alérgicas de la piel (dermatitis de contacto) en personas alérgicas a esta vitamina.

**Efectos adversos de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):** muy ocasionalmente reducción en el número de plaquetas (células de la sangre encargadas de la coagulación). Mareo, inquietud, insomnio, reducción de la sensibilidad y hormigueos, inestabilidad, adormecimiento de pies o manos, que generalmente disminuyen al interrumpirse el tratamiento. Síndrome de abstinencia a Piridoxina más probable cuanto mayores son las dosis. Afectación de la memoria con dosis elevadas. Cambios en el color y olor de la orina. Hinchazón, irritación y enrojecimiento de los ojos, empeoramiento de la enfermedad de Leber (enfermedad hereditaria que provoca pérdida de visión). Molestias digestivas como molestias abdominales, diarrea transitoria, pérdida del apetito. Fotosensibilidad con lesiones en la piel como ampollas. Ocasionalmente reacción anafiláctica (alérgica) con erupción, picazón, hinchazón, dificultad respiratoria, sudor, aumento de los latidos del corazón, disminución de la presión arterial, casos de afección con nódulos y pus en la cara y el cuello. La Piridoxina administrada a madres en periodo de lactancia puede producir supresión de la leche materna, dolor y aumento de las mamas.

#### 5. CONSERVACIÓN DE DIOXAFLEX COMPLEX

**Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original.**

No utilice **Dioxaflex Complex** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

#### 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

**Composición de Dioxaflex Complex**

Los principios activos son Diclofenaco Sódico, Tiamina Mononitrato (Vit. B1), Piridoxina Clorhidrato (Vit. B6) y Cianocobalamina (Vit. B12). Cada Comprimido Recubierto contiene: Diclofenaco Sódico 50 mg, Tiamina Mononitrato (Vit. B1) 48,53 mg, Piridoxina Clorhidrato (Vit. B6) 50 mg, Cianocobalamina (Vit. B12) 250 mcg. Excipientes: Carboximetilcelulosa Reticulada, Anhidrido Silícico Coloidal, Lactosa, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Hipromelosa, Dioxido de Titanio, Triacetina, Maltodextrina, Amarillo Óxido Férrico.

**Aspecto del producto y contenido del envase**

Cada envase contiene 15 Comprímdos Recubiertos oblongos, grabados con DIC, color amarillo.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **DIOXAFLEX COMPLEX** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**El producto puede presentar un olor característico debido a su contenido de vitaminas.**

Para información adicional o ante cualquier duda referida a la seguridad del producto comunicarse con Laboratorios Bagó – Información de Productos, Dirección Médica: infoproducto@bago.com.ar – 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 55.547.

Información para el paciente autorizada por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 12.255/17.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

# Bagó

Ética al servicio de la salud

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

Código	<b>51002317</b>
Programa: Illustrator CS5 Impresión al 100%	
Material: Prospecto	Dto. de Documentación
Tintas:  432U	
	
<b>Observaciones:</b> Control dimensional, remitirse a plano correspondiente.	