



Leucotrofina Timomodulina 0,4 %

Solución Oral

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA



FÓRMULA

Cada 100 ml de Solución Oral contiene: Timomodulina 400 mg. Excipientes: Glicerina; Sorbitol Solución; Alcohol; Ácido Cítrico; Metilparabeno; Propilparabeno; Esencia de Frutilla; Agua Purificada.

Contiene Alcohol Etilico 4,46 g /100 ml.

Este Medicamento es Libre de Gluten.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Inmunoestimulante.

Coadyuvante en enfermedades infecciosas, virales y bacterianas.

INDICACIONES

Terapia de los síndromes leucopénicos primarios (generalmente uno de los aspectos del síndrome pancitopénico) y secundarios a agentes mielotóxicos (roentgenterapia, cobaltoterapia, betatron, quimioterapia citostática) o inmuoalergizantes.

Déficit de la formación de anticuerpos.

Inmunoestimulante. Coadyuvante en enfermedades infecciosas, virales y bacterianas.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis se establecerá de acuerdo al criterio médico y a las características del cuadro clínico. Como posología media de orientación, se aconseja:

Adultos:

Una ampolla bebible al día, separada de las comidas.

Niños:

Para uso pediátrico la dosis debe ser oportunamente reducida en función del peso y la edad.

ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS

No presenta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS. CONTRAINDICACIONES

Especialmente se han observado fenómenos alérgicos en pacientes sensibilizados contra proteínas bovinas, por lo que debe ejercerse precaución al tratar pacientes con hipersensibilidad a las mismas. Si se desarrolla reacción alérgica, debe suspenderse el tratamiento.



Usar con precaución en el caso de enfermedades autoinmunes.

No se debe administrar a pacientes bajo tratamiento con disulfiram. Basado en la presencia de alcohol etílico/etanol como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas, niños.

EFFECTOS TÓXICOS

No posee.

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS

No posee.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 10 frascos-ampolla bebibles con Solución Oral.

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **LEUCOTROFINA** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nro. 38.457.



Ética al servicio de la salud

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires.
Tel.: (0221) 425-9550/54.

51003800