



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lucidex XR 28  
Memantina Clorhidrato 28 mg

Cápsulas de Liberación Prolongada

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA

Este Medicamento es Libre de Gluten.



Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Contenido del prospecto

1. QUÉ ES LUCIDEX XR 28 Y PARA QUÉ SE UTILIZA
2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR LUCIDEX XR 28
3. CÓMO TOMAR LUCIDEX XR 28
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
5. CONSERVACIÓN DE LUCIDEX XR 28
6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

1. QUÉ ES LUCIDEX XR 28 Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Lucidex XR 28 pertenece a una clase de sustancias llamadas antagonistas de NMDA. Se utiliza para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR LUCIDEX XR 28

No tome Lucidex XR 28 en los siguientes casos

Si sabe que es alérgico (hipersensible) a la Memantina Clorhidrato o a cualquiera de los demás componentes de Lucidex XR 28.

Tenga especial cuidado con Lucidex XR 28 si:

- tiene o alguna vez ha tenido convulsiones.
- tiene o alguna vez ha tenido alteraciones renales o urinarias que afecten parámetros químicos de su orina.
- si está tomando, en forma concomitante, algún fármaco o preparado que contenga bicarbonato de sodio.

Si se le aplica cualquiera de los anteriores, su médico puede necesitar controlarlo más estrechamente mientras esté tomando este medicamento.

Lucidex XR 28 con alimentos y bebidas

Lucidex XR 28 puede tomarse con o sin alimentos. Las cápsulas de Lucidex XR 28 pueden abrirse y espolvorearse sobre puré de manzanas antes de ingerirse, pero debe tomarse el contenido de toda la cápsula y la dosis no debe dividirse. Excepto cuando se abra y espolvoree sobre puré de manzanas, las cápsulas de Lucidex XR 28 deben tragarse enteras y no aplastarse, dividirse o masticarse.

Lucidex XR 28 y personas mayores

Lucidex XR 28 puede ser utilizado por pacientes mayores de 65 años de edad, así como por pacientes con enfermedad de Alzheimer de 65 o menos años de edad.

Lucidex XR 28 y niños

No se recomienda el uso de Lucidex XR 28 en niños.

Embarazo

Informe a su médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada. En caso de embarazo, los beneficios de Lucidex XR 28 deben ser evaluados frente a los posibles efectos sobre el feto. Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento durante el embarazo.

Lactancia

Usted no debe amamantar durante el tratamiento con Lucidex XR 28. Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento mientras esté en período de lactancia.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico acerca de cualquier otro medicamento que esté tomando o haya tomado recientemente, incluyendo cualquiera que haya tomado sin prescripción.

3. CÓMO TOMAR LUCIDEX XR 28

Siga cuidadosamente todas las instrucciones que le dé su médico, incluso si difieren de las dadas en este prospecto.

La dosis de mantenimiento recomendada es:

Lucidex XR 28 1 cápsula de liberación prolongada una vez al día.

Cómo iniciar el tratamiento

El tratamiento con Memantina comienza generalmente con una dosis baja y se incrementa gradualmente hasta alcanzar la dosis de mantenimiento.

Una vez que se ha alcanzado la dosis de mantenimiento puede continuar con la misma dosis diaria a menos que su médico le indique lo contrario. Para los pacientes con insuficiencia renal severa, la dosis de mantenimiento recomendada es más baja, consulte a su médico.

Durante el curso del tratamiento, su médico puede cambiar la dosis para ajustarla a sus necesidades individuales.

Si usted está tomando actualmente otra formulación de Memantina Clorhidrato, consulte a su médico acerca de cómo cambiar a Lucidex XR 28.

Si se olvidó de tomar Lucidex XR 28

Si usted se olvida de tomar una dosis de Lucidex XR 28, no duplique su dosis siguiente. Tome la dosis siguiente según lo programado.



Laboratorios Bagó S.A.

Departamento de Ingeniería de Productos

CÓDIGO	51005165	MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO		
PROGRAMA	InDesign		FECHA	FIRMA
ESCALA	1:1			
PIEZA GRÁFICA	Prospecto	CONFECCIÓN	18/03/24	Giomi
TINTAS:	Frente 432	Dorso	432	
OBSERVACIONES Control dimensional, remitirse a plano correspondiente.				

Si se ha olvidado de tomar **Lucidex XR 28** durante varios días, no tome la dosis siguiente hasta que haya hablado con su médico.

**Si toma más Lucidex XR 28 del que debiera**

Ante la eventualidad de haber tomado una dosis mayor a la que debiera de **Lucidex XR 28**, contacte a su médico, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, **Lucidex XR 28** puede producir efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufren.

Los efectos secundarios más comunes en pacientes que toman **Lucidex XR 28** fueron: dolor de cabeza, mareos, diarrea, somnolencia.

No se alarme por esta lista de posibles efectos secundarios. Puede que no experimente ninguno de ellos.

**5. CONSERVACIÓN DE LUCIDEX XR 28**

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.**

No utilice **Lucidex XR 28** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

**6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Composición de Lucidex XR 28**

Cada Cápsula de Liberación Prolongada contiene: Memantina Clorhidrato (como Memantina Clorhidrato Microgránulos) 28 mg. Los demás componentes son: Esferas de Azúcar, Povidona, Etilcelulosa, Triglicéridos de Cadena Media, Hipromelosa, Talco blanco, Amarillo de Quinolina, Amarillo Ocaso FCF, Azul Brillante FCF, Dióxido de Titanio, Gelatina.

**Aspecto de Lucidex XR 28 y contenido del envase**

Las Cápsulas de Liberación Prolongada de **Lucidex XR 28** son como se detalla a continuación: envases conteniendo 28 Cápsulas de Liberación Prolongada verde oscuro y verde claro.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **LUCIDEX XR 28** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / [soibago@bago.com.ar](mailto:soibago@bago.com.ar).

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 52.346.  
Información para el paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 8370/15.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

Registro Sanitario Ecuador Nro. 6377-MEE-0621.  
Venta bajo receta médica.

Vía Oral.  
Importado y distribuido por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A. Quito -Ecuador.



**Ética al servicio de la salud**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.  
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.  
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

51005165