Afebril 200 VL

Ibuprofeno

Forma Farmacéutica: Comprimidos Masticables.

Industria Argentina

Condición de Expendio: VL Venta Libre.

Fórmula Cuali-Cuantitativa:

Afebril 200 VL, Comprimidos Masticables

Sabor Frutilla - Naranja,

Cada comprimido masticable contiene:

Ibuprofeno (como Ibuprofeno Microencapsulado)	**200,000**	**mg**
Excipientes:		
Aspartamo	18,750	mg
Ácido Fumárico	69,000	mg
Manitol	286,400	mg
Carboximetilcelulosa Reticulada	22,500	mg
Povidona	5,900	mg
Esencia de Frutilla	5,600	mg
Esencia de Naranja	5,600	mg
Laca Alumínica Rojo Allura	1,800	mg
Talco	7,500	mg
Estearato de Magnesio	7,500	mg
Celulosa Microcristalina c.s.p.	750,000	mg

Afebril 200 VL, Comprimidos Masticables

Sabor Uva

Cada comprimido masticable contiene:

Ibuprofeno (como Ibuprofeno Microencapsulado)	**200,000**	**mg**
Excipientes:		
Aspartamo	22,500	mg
Ácido Fumárico	69,000	mg
Manitol	286,400	mg
Carboximetilcelulosa Reticulada	22,500	mg
Povidona	5,900	mg
Esencia de Uva	11,200	mg

Laca Alumínica Azul Brillante	2,900	mg
Laca Alumínica Rojo Allura	6,900	mg
Talco	7,500	mg
Estearato de Magnesio	7,500	mg
Celulosa Microcristalina c.s.p.	750,000	mg

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, **"Afebril 200 VL"** *no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antifebril. Analgésico. Antiinflamatorio.

USO DEL MEDICAMENTO

Lea detenidamente esta información

Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO

A modo de orientación las dosis recomendadas son:

Menores de 4 años	Se sugiere consultar con el médico	
Niños de 4 a 5 años	16 a 21 kg	½ a 1 comprimido cada 8 horas
Niños de 6 a 8 años	21 a 27 kg	1 comprimido cada 8 horas
Niños de 9 a 10 años	27 a 32 kg	1 y ½ comprimido cada 8 horas
Niños de 11 años en adelante	A partir de 32 kg	1 y ½ a 2 comprimidos cada 8 horas

En todos los casos, no administrar más de tres veces por día.

Modo de Administración

Masticar o disolver lentamente en la boca, luego ingerir.

Alternativamente, de ser conveniente o necesario, los comprimidos masticables se pueden triturar y disolver en agua, leche u otras bebidas sin alcohol. Asimismo, los niños y adultos con buena capacidad para deglutir, pueden ingerirlos enteros.

Los alimentos o los medicamentos antiácidos generalmente no afectan la absorción en forma significativa.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar si es alérgico al Ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios o cualquier componente de la fórmula, o si padece la enfermedad fenilcetonuria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No usar si el envase está abierto o dañado.

No tomar por más de 5 días para calmar dolores ni por más de 3 días para bajar la fiebre a menos que sea indicado por un médico. Si el dolor o la fiebre persisten o se agravan, si se presentan nuevos síntomas o si el área dolorida está roja o hinchada, consulte al médico.

Si se encuentra bajo tratamiento médico debido a alguna afección grave, consulte al médico antes de ingerir este producto.

Al igual que ocurre con la aspirina, o el paracetamol, si surge una afección que requiere la administración de medicamentos venta bajo receta, o si ha tenido algún efecto secundario por ingerir cualquier analgésico de venta libre, no tome este producto, sin antes consultar al médico.

Si experimenta algún síntoma inusual o que no parece relacionado a la afección por la cual está tomando este producto, consulte al médico antes de continuar su administración.

Por contener aspartamo no es apto para fenilcetonúricos.

Interacciones medicamentosas:

La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar los efectos terapéuticos pero también los tóxicos.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria y/o agranulocitosis.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez": Tel. (011) 4962-6666/2247.

Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna): Tel. (011) 4300-2115.

Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas: Tel (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica- La Plata - Tel.: (0221) 451-5555

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 10 Comprimidos Masticables.

Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico

Conservar al abrigo del calor (no mayor de 25°C) y de la humedad excesiva.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, "Afebril 200 VL" DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Calle 4, №1429 (B1904CIA) La Plata - Pcia. de Buenos Aires - Tel.: (0221) 425-9550/54.

Administración: Bernardo de Irigoyen 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Julio César Marangoni - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado №: 52.059

Prospecto autorizado por la ANMAT Disp. № 5443