

PROYECTO DE PROSPECTO

Dioxaflex VL **Diclofenac Potásico 25 miligramos** **Comprimidos Recubiertos**

Industria Argentina
VL Venta Libre



Analgésico. Antiinflamatorio

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE DIOXAFLEX VL?

Cada Comprimido Recubierto contiene: Diclofenac Potásico 25 miligramos. Excipientes: Lactosa, Carboximetilcelulosa Reticulada, Anhídrido Silícico Coloidal, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Opadry FX 62W28547 Silver (*), Laca Aluminica Amarillo Ocaso.

(*) Opadry FX 62W28547 Silver está compuesto por: Carboximetilcelulosa Sódica, Maltodextrina, Dextrosa, Lecitina, Dióxido de Titanio, Silicato de Potasio y Aluminio.

Este Medicamento es Libre de Gluten

ACCIONES

Analgésico. Antiinflamatorio

¿PARA QUÉ SE USA DIOXAFLEX VL?

Dioxaflex VL es un medicamento que se utiliza para el alivio de dolores musculares y de articulaciones, especialmente los que se acompañan de inflamación. También está indicado en dolores de espalda, dolor de cabeza, dolores dentales y dolor menstrual.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR DIOXAFLEX VL?

NO utilizar **Dioxaflex VL** en caso de: alergia conocida a alguno de los componentes del producto, a la aspirina u otros antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias; hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante; insuficiencia hepática o renal; enfermedades serias de la sangre; uso de diuréticos; embarazo o lactancia.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de utilizar **Dioxaflex VL** conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.

-Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

-Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica.

-Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

Información importante sobre los componentes de Dioxaflex VL

Este medicamento contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar **Dioxaflex VL**.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Dioxaflex VL no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que aparece en el al dorso del envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea o dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas o manos, dificultad para respirar.

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece cualquier síntoma que le impresione relacionado al uso del producto, que le ocasione preocupación o que le parezca poco usual.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

- Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido Recubierto de **Dioxaflex VL** tres veces al día (cada 8 horas).
- Dolor menstrual: 1 Comprimido Recubierto de **Dioxaflex VL** 1 ó 2 veces por día.
- Dosis máxima: 3 Comprimidos Recubiertos de **Dioxaflex VL** al día. No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las dosis salvo por orden médica.

Mayores de 65 años o menores de 15 años: consulte con su médico.

Transcurridos 3 días de uso sin mejoría o con empeoramiento de los síntomas, se recomienda consultar al médico.

No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.

Ingerir los Comprimidos Recubiertos de **Dioxaflex VL** con suficiente líquido. La presencia de alimentos en el estómago en el momento de la ingestión suele mejorar la tolerabilidad, sin afectar su efecto terapéutico en forma significativa.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.*

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 (siendo estas últimas cinco presentaciones para envases tipo Dispenser), 500 y 1000 Comprimidos Recubiertos redondos, color naranja, siendo las dos últimas presentaciones para Uso Hospitalario Exclusivo.

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. Mantener en su envase original.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

De ser necesaria información adicional sobre el producto comuníquese con Laboratorios Bagó: 0810-666-7766 o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

www.bagoconsumomasivo.com.ar

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 56.264.
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro.



Ética al servicio de la salud

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina Mariana
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda
CUIL 27177154259



Ética al servicio de la salud