



# Bagó B1-B6-B12 10.000

## Vitaminas B1, B6, B12

Inyectable

Industria Argentina

EXPENDIO BAJO RECETA

### Terapia vitamínica de acción eutrófica general.

#### Fórmula

Cada frasco-ampolla contiene: Hidroxocobalamina, 10.000 mcg; Clorhidrato de Tiamina, 100 mg; Clorhidrato de Piridoxina, 200 mg. Cada ampolla contiene: Clorhidrato de Lidocaína 20 mg. Excipientes: Citrato de Sodio; Ácido Cítrico; Metilparabeno; Propilparabeno; Polietilenglicol 400; Alcohol; Agua para inyectables c.s.p. 2,5 ml.

#### Acción terapéutica

Vitamínico. Antianémico. Neurotrófico. Antiálgico.

#### Posología/Dosificación – Modo de Administración

La dosis varía de acuerdo con el criterio médico y el cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación, se aconseja:

---

1-2 frascos-ampolla por día,  
por vía intramuscular profunda exclusivamente.

---

#### Contraindicaciones

Antecedentes de alergia a la Tiamina, Lidocaína o a alguno de los componentes de la formulación.

#### Precauciones y Advertencias

A las dosis terapéuticas, no presenta.

#### Antagonismos y Antidotismos

A las dosis aconsejadas, no se han descrito.

#### Interacciones

- *Tiamina (Vitamina B<sub>1</sub>)*: La Tiosemicarbazona y el 5-Fluorouracilo anulan su acción. Los antiácidos inhiben su absorción.
- *Piridoxina (Vitamina B<sub>6</sub>)*: Administrada simultáneamente con medicamentos que contengan levodopa, acelera la metabolización de ésta última, inhibiendo su efecto.

#### Reacciones adversas

A las dosis recomendadas, el medicamento es bien tolerado y no se producen efectos colaterales o secundarios. No se han descrito



para sus principios activos, signos de hipervitaminosis luego de utilización por largo tiempo de dosis elevadas.

Solamente en personas hipersusceptibles, la administración de Tiamina (Vitamina B<sub>1</sub>) por vía intravenosa y eventualmente por vía intramuscular, puede llegar a provocar reacciones anafilactoides que obliguen a suprimir el tratamiento.

**Sobredosificación:** En caso de intoxicación, consultar con urgencia al médico o comunicarse con un Centro de Toxicología: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde Tel.: (011) 4300-2115.

Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**Presentación:** Envases conteniendo 3 ó 6 frascos-ampolla con polvo y 3 ó 6 ampollas con solvente.

**Conservar al abrigo del calor (no mayor de 30 °C). Proteger de la luz.**

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓ B1 B6 B12 10.000** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente.

Certificado Nro. 33.230.

La consulta médica regular es uno de los pilares de la Medicina Preventiva. Consulte periódicamente a su médico.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 1954/94.

Una tonalidad no uniforme del sólido contenido en el frasco-ampolla puede manifestarse debido a migración de vitamina B12 durante el proceso de liofilización, llegando a concentrar parte de la misma en el centro de la superficie de la pastilla. Esto no altera en absoluto la acción terapéutica del producto.



**Laboratorios Bagó S.A.**

Investigación y Tecnología Argentina

Adm.: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).

Tel.: (011) 4344-2000/19. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). Tel.: (0221) 425-9550/54. La Plata.

Provincia de Buenos Aires.