

BIL 13 ENZIMATICO - COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Contenido por unidad de venta: Envases conteniendo 20 y 40 comprimidos recubiertos.

Fórmula cuali-cuantitativa:

Cada comprimido contiene:

Clorhidrato de Metoclopramida	10 mg
Acido Dehidrocólico	100 mg
Pancreatina 3 NF (gastroresistente)	300 mg
Dimetilpolisiloxano activado	50 mg
Etilcelulosa	8 mg
Anhídrido Silícico Coloidal	10 mg
Celulosa Microcristalina	160 mg
Lactosa	csp
	650 mg

Cada 1.000 g de laca de recubrimiento contiene:

Metilcelulosa	40,0000 g
Etilcelulosa	2,0000 g
Polietilenglicol 6.000	5,0000 g
Dióxido de Titanio	10,0000 g
Tartrazina	0,0005 g
Verde S	0,0600 g
Propilenglicol	5,0000 g
Agua Desmineralizada	15,0000 g
Metanol	235,0000 g
Cloruro de Metileno	412,9395 g
Alcohol	275,0000 g

Acción Terapéutica:

Normorregulador digestivo.

Posología y forma de administración:

La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación para adultos, se aconseja:

- 1 comprimido antes o durante las comidas.

Acciones colaterales y secundarias:

A las dosis terapéuticas recomendadas, el medicamento es generalmente bien tolerado.

En pacientes hipersusceptibles, la Metoclopramida puede llegar a provocar trastornos leves tales como somnolencia, lasitud, vértigos, cefalea, insomnio, diarrea. Muy raramente, sobre todo en sujetos jóvenes, pueden llegar a presentarse síntomas extrapiramidales (espasmos faciales, movimientos involuntarios, tortícolis) que se desaparecen espontáneamente o con la suspensión del tratamiento.

En casos de tratamientos muy prolongados con metoclopramida, la bibliografía registra la aparición de disquinesias tardías, efectos endocrinos (amenorrea, galactorrea, ginecomastia, hiperprolactinemia) y trastornos depresivos.

Precauciones y Advertencias:

Como con todo medicamento, no se aconseja la utilización del producto durante el embarazo y la lactancia, hasta tanto los estudios pertinentes demuestren la total inocuidad sobre tales estados.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

Antagonismos y Antidotismos:

A las dosis aconsejadas, no han sido descriptos.

Interacciones:

Se han descripto interacciones medicamentosas sólo para la metoclopramida:

- Neurolépticos: existe sinergia de efectos a nivel del SNC.
- Anticolinérgicos: disminuyen la acción de la metoclopramida sobre la motilidad gastrointestinal.
- Antiparkinsonianos: posible inhibición de la acción de los mismos.
- Digoxina: Su absorción puede llegar a disminuir.
- Levodopa, paracetamol: Su absorción puede llegar a aumentar.

**AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, "BIL 13 ENZIMATICO"
DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

NOTA: PARA UNA OPTIMA CONSERVACION DEL PRODUCTO, SE RECOMIENDA SU MANTENIMIENTO EN UN LUGAR FRESCO.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Calle 4, Nº1429 (B1904CIA) La Plata - Pcia. de Buenos Aires - Tel.: (0221) 425-9550/54

Administración: Bernardo de Irigoyen 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Julio César Marangoni - Farmacéutico.

***Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio
de Salud y Ambiente. Certificado Nº: 19.895***

Prospecto autorizado por Disposición Nº 2268.