



Leucotrofina

Timomodulina

Solución Oral

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA

Inmunoestimulante. Coadyuvante en enfermedades infecciosas, virales y bacterianas.

Fórmula:

Cada frasco-ampolla bebible de **Leucotrofina** contiene:
Timomodulina, 60 mg. Excipientes: Glicerina, Sorbitol 70%, Alcohol, Ácido Cítrico, Ésteres del Ácido p-Hidroxibenzoico, Esencia de Frutilla y Agua Purificada c.s.p. 15 ml.
Contiene Alcohol Etilico 4,46 g/100 ml

Acción Terapéutica:

Inmunoestimulante. Coadyuvante en enfermedades infecciosas, virales y bacterianas.

Indicaciones:

Terapia de los síndromes leucopénicos, primarios (generalmente uno de los aspectos del síndrome pancitopénico) y secundarios a agentes mielotóxicos (roentgenterapia, cobaltoterapia, betatron, quimioterapia citostática) o inmuoalergizantes.

Déficit de la formación de anticuerpos.

Inmunoestimulante. Coadyuvante en enfermedades infecciosas, virales y bacterianas.

Posología y forma de administración:

La dosis se establecerá de acuerdo al criterio médico y a las características del cuadro clínico. Como posología media de orientación, se aconseja:

Adultos:

Una ampolla bebible al día, separada de las comidas.

Niños:

Para uso pediátrico la dosis debe ser oportunamente reducida en función del peso y la edad.

**Acciones colaterales y secundarias.**

No presenta.

Precauciones y Advertencias. Contraindicaciones.

Especialmente se han observado fenómenos alérgicos en pacientes sensibilizados contra proteínas bovinas, por lo que debe ejercerse precaución al tratarse pacientes con hipersensibilidad a las mismas. Si se desarrolla reacción alérgica, debe suspenderse el tratamiento.

Usar con precaución en el caso de enfermedades autoinmunes.

No se debe administrar a pacientes bajo tratamiento con disulfiram.

Basado en la presencia de alcohol etílico/etanol como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas, niños.

Efectos Tóxicos.

No posee.

Antagonismos y Antidotismos.

No posee.

Sobredosificación.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología, por ejemplo:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde (011) 4300-2115.

Hospital Dr. A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentación:

Envase conteniendo 10 frascos-ampollas bebible con Solución Oral.

Conservar al abrigo del calor (no mayor de 30°C).

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **LEUCOTROFINA** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente. Certificado Nro. 38.457.

**Laboratorios Bagó S.A.**

Investigación y Tecnología Argentina

Adm.: Bernardo de Irigoyen Nro. 248. (C1072AAF)

Tel.: (011) 4344-2000/19. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Director Técnico: Julio C. Marangoni. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429. (B1904CIA) Tel.: (0221) 425-9550/54. La Plata.