Dioxaflex Complex

Diclofenaco Sódico 75 mg
Vitaminas B1, B6, B12

Inyectable

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a
porque contiene información importante para usted
• Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener qu
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
• Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a
tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarl
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata
que no aparecen en esta información para el paciente

Contenido de la información para el paciente

• QUÉ ES DIOXAFLEX COMPLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZ
• QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR DIOXAFLEX
• CÓMO USAR DIOXAFLEX COMPLEX
• POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
• CONSERVACIÓN DE DIOXAFLEX COMPLEX
• CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONA

Su administración está reservada principalmente para los casos agudos serios y cuando la vía oral no es viable o no se la considera de primera elección.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR DIOXAFLEX COMPLEX

Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie o controle el dolor y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

No use Dioxaflex Complex si:

Es alérgico (hipersensible) al Diclofenaco, a la Hidroxocobalamina, Tiamina o Piridoxina o a cualquiera de los demás componentes del medicamento, ncluyendo el cobalto.

Es alérgico o ha tenido reacciones alérgicas a la aspirina u otros analgésicos (medicamentos para tratar el dolor) o antiinflamatorios similares. Las eacciones pueden incluir asma (dificultad para respirar), urticaria (reacción alérgica en la piel con aparición de ronchas y picazón), rinitis aguda (inflamación de la mucosa nasal) o hinchazón de los labios o párpados. Si cree que puede ser alérgico consulte a su médico.

Padece actualmente una úlcera o hemorragia de estómago o intestino o ha tenido dos ó más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados relacionados con tratamientos anteriores con antiinflamatorios no esteroides.

Padece de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activa (enfermedades que producen diarrea con o sin sangre y dolor abdominal).

Padece una enfermedad cardíaca establecida y/o una enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, si ha tenido un ataque al corazón, accidente cerebrovascular (ACV), accidente isquémico transitorio (AIT) u obstrucción en los vasos sanguíneos del corazón o del cerebro, o una operación para eliminar alguna obstrucción o hacerle un bypass coronario.

Tiene o ha tenido problemas con la circulación sanguínea (enfermedad arterial periférica).

Padece una enfermedad grave de los riñones, del hígado o insuficiencia severa de la función del corazón no controlada.

Presenta alteraciones en la coagulación de la sangre o está tomando medicamentos usados para evitar la formación de coágulos (anticoagulantes).

Padece la enfermedad de Leber (enfermedad hereditaria que provoca pérdida de visión), o ambliopía tabáquica (disminución de la agudeza visual) porque podría agravarse su condición.

Está en tratamiento con levodopa (medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson).

Padece policitemia vera (una enfermedad caracterizada por incremento de las células sanguíneas, principalmente de los glóbulos rojos), dado que este medicamento puede enmascarar los síntomas.

Si padece psoriasis (enfermedad inflamatoria de la piel, que ocasionalmente también afecta a las articulaciones, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón de las articulaciones).

Se encuentra embarazada o amamantando a su bebé.

Tenga especial cuidado con Dioxaflex Complex si:

Ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación de estómago o de intestino pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro o incluso cursar sin síntomas previos de alerta. Este riesgo es mayor al usar dosis altas, en los ancianos y en pacientes debilitados. Consulte a su médico inmediatamente en caso de presentar algunos de estos síntomas. Su médico le puede recomendar en estos casos comenzar el tratamiento con la menor dosis efectiva y asociar un medicamento protector del estómago.

Tiene problemas cardíacos, antecedentes de ataques cerebrales o piensa que puede tener riesgo de sufrir estas patologías (por ejemplo si tiene la presión arterial alta, insuficiencia cardíaca descompensada, trastornos en la circulación, sufre diabetes, tiene aumentado el colesterol, o es fumador) debe consultar este tratamiento con su médico, ya que los medicamentos que contienen Diclofenaco como Dioxaflex Complex se pueden asociar con un leve aumento del iesgo de sufrir ataques cardíacos ("infarto de miocardio") o cerebrales ("accidente cerebrovascular"), especialmente cuando se emplean en dosis altas y en ratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendados. Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir etención de líquidos, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o presión arterial elevada (hipertensión arterial). Acuda inmediatamente a su médico si presenta dolor de pecho, dificultad para respirar, debilidad, dificultad para hablar o moverse.

Presenta alteraciones previas de la función de los riñones, insuficiencia en la función del corazón o del hígado, usa diuréticos o es de edad avanzada, ya que puede presentar mayor riesgo de efectos secundarios sobre los riñones.

Presenta síntomas de reacciones alérgicas como dificultad para respirar o tragar, hinchazón de labios, lengua y garganta o cuerpo en general, disminución de la presión de la sangre, palpitaciones o desmayo. Debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con Dioxaflex Complex y contactar con su médico o acudir inmediatamente al servicio de urgencias del hospital más cercano.

Le aparece una erupción en la piel (incluidas lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales, como ampollas, descamación o sangrado). Debe interrumpir el tratamiento con Dioxaflex Complex y consultar a su médico inmediatamente.

Presenta signos clínicos y/o síntomas relacionados con enfermedad hepática (por ejemplo náuseas, vómitos, fatiga, prurito, coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos, erupción en la piel), consulte a su médico dado que el tratamiento debe ser discontinuado por precaución.

Está tomando otros medicamentos antiinflamatorios, incluyendo aspirina, anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios del tipo de la aspirina, otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo de hemorragias como corticoides o medicamentos antidepresivos inhibidores selectivos de la ecaptación de serotonina.

Presenta asma, rinitis alérgica estacional, inflamación de la mucosa nasal (es decir pólipos nasales), enfermedad pulmonar obstructiva crónica o nfecciones crónicas del tracto respiratorio.

Presenta enfermedad del hígado, o trastornos hemorrágicos u otros trastornos de la sangre incluyendo porfiria hepática (enfermedades metabólicas, generalmente hereditarias).

Hubiese padecido con anterioridad una alergia a la Tiamina al contacto con su piel (dermatitis de contacto) por motivos profesionales, dado que podría sufrir una recaída con la administración de este medicamento.

Tiene predisposición a padecer gota (enfermedad por depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones con dolor e inflamación) debe tener precaución porque la Hidroxocobalamina puede precipitar una crisis gotosa.

Se expondrá al sol por tiempo prolongado o a lámpara de rayos ultravioleta (UVA) ya que la Piridoxina puede aumentar la sensibilidad a la luz produciendo esiones en la piel.

Consulte a su médico si presentara alguna de las situaciones mencionadas.

Uso de Dioxaflex Complex con otros medicamentos

nforme a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta o derivados de hierbas.

Ciertos medicamentos pueden interferir con Dioxaflex Complex, en estos casos puede ser necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de ellos.

Es especialmente importante que informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente alguno de los siguientes medicamentos:
Medicamentos inhibidores de la recaptación de la serotonina (para tratar algunos tipos de depresión o ansiedad).
Otros medicamentos del mismo grupo del Diclofenaco, como la aspirina o el ibuprofeno o cualquier otro AINE.
Medicamentos anticoagulantes de administración oral (para prevenir la formación de coágulos en la sangre). Su médico deberá controlar los parámetros de coagulación cuando empiece o termine el tratamiento con Dioxaflex Complex.
Medicamentos del tipo de los corticoides (medicamentos para tratar y aliviar inflamaciones o en enfermedades autoinmunes).
Medicamentos que contienen metotrexato (para tratar una enfermedad denominada artritis reumatoidea y algunos tipos de cáncer).
Medicamentos que contienen ciclosporina, tacrolimus, azatioprina, ciclofosfamida, mercaptopurina (usados durante los trasplantes de órganos o el ratamiento de algunos tipos de cáncer), 5-fluorouracilo (para el tratamiento de algunos tipos de cáncer), colchicina (tratamiento de la gota).
Medicamentos para tratar problemas del corazón como amiodarona, digoxina o verapamilo; puede ser necesario que su médico controle los niveles de digoxina en la sangre.
Medicamentos utilizados para tratar la diabetes; su médico puede requerir controlar los niveles de glucosa en la sangre.
Medicamentos para aumentar la cantidad de orina (diuréticos).
Medicamentos anticonvulsivantes (utilizados para tratar los ataques epilépticos) como el fenobarbital o la fenitoína. Si está tomando fenitoína, su médico puede requerir controlar los niveles de fenitoína en la sangre.
Medicamentos empleados para el tratamiento de la presión arterial elevada como beta-bloqueantes, hidralazina, isoniazida, o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA).
Medicamentos que contienen un antibiótico denominado trimetoprima (para prevenir y tratar enfermedades del tracto urinario u otras infecciones bacterianas).
Medicamentos que contienen cloranfenicol, quinolonas, ceftriaxona, neomicina (para tratar las infecciones por bacterias), voriconazol (un medicamento utilizado en el tratamiento de infecciones por hongos), isoniazida, ácido paraaminosalicílico, aminosalicilatos (antibióticos empleados para el tratamiento de la tuberculosis) o penicilamina.
Medicamentos que contienen misoprostol (para tratar las úlceras de estómago).
Medicamentos que contienen colestiramina (para disminuir los niveles de colesterol en sangre).
Levodopa (medicamento para el tratamiento del Parkinson).
Anticonceptivos orales.
Formulaciones de potasio de liberación prolongada.
Ácido ascórbico (antioxidante), ácido fólico (usado para el tratamiento de algunas anemias).

Uso de Dioxaflex Complex con alimentos, bebidas y alcohol
La ingesta de bebidas alcohólicas junto con este medicamento puede aumentar su toxicidad.
Uso en niños
No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 12 años de edad por lo cual no debe administrarse a este grupo de pacientes.
Uso en pacientes de edad avanzada
Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles que el resto de adultos a las lesiones de estómago y duodeno inducidas por AINE. Además los AINE pueden causar retención de líquidos, pudiendo producir complicaciones cardiovasculares y reducción de la eficacia de los tratamientos para reducir a presión arterial. Se recomienda en estos pacientes utilizar la menor dosis efectiva.
Fertilidad
Las pacientes que quieren quedar embarazadas deben tener en cuenta que los medicamentos del tipo de Diclofenaco se han asociado a una disminución de la capacidad para concebir.

Embarazo
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.
Debido a que la administración de medicamentos del tipo de Diclofenaco se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas / abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible.
En el tercer trimestre la administración de Diclofenaco está contraindicada.
Lactancia
No deberá tomar Dioxaflex Complex si usted está amamantando, o debe suspender la lactancia si el medicamento es estrictamente necesario para la madre.
Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinarias
Este medicamento puede producir somnolencia, mareos o cansancio en algunos pacientes. Evitar conducir y/o utilizar máquinas durante el tratamiento con Dioxaflex Complex.

3. CÓMO USAR DIOXAFLEX COMPLEX

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico incluso si difieren de las descriptas en esta información.
Dosis habitual: 1 frasco-ampolla por día, durante 2 a 3 días, por vía intramuscular profunda.
Dosis máxima: 1 frasco-ampolla cada 12 horas, por vía intramuscular profunda, durante un tiempo máximo de 2 días.
De ser necesario se puede continuar el tratamiento por vía oral.
Modo de preparación
Tomar el contenido de la ampolla preferentemente con una jeringa de 5 ml provista de aguja 40/8 o 25/6, apoyando la misma sobre una pared de la ampolla, con el fin de introducir la menor cantidad de aire posible. No debe quedar ningún espacio de aire contenido en la jeringa. Introducir el contenido de la jeringa en el frasco-ampolla que contiene el liofilizado (polvo) ubicado en posición horizontal, apoyando nuevamente la aguja sobre una de las paredes. Agitar moderadamente hasta obtener una solución homogénea. Una vez preparado el inyectable debe ser usado inmediatamente.
Modo de aplicación
Para disminuir al mínimo los riesgos de molestias en el lugar de inyección o efectos adversos locales, se recomienda cumplir cuidadosamente las reglas de aplicación de inyectables, en especial:
- Cuidadosa desinfección del sitio de aplicación.
- Cuidar la asepsia (limpieza) durante la manipulación.
- Aplicar lo más profundamente posible.
- Inyectar en forma lenta.
- Masajear suavemente la zona para facilitar la distribución del líquido.

Si usa más Dioxaflex Complex del que debiera
Dada la vía de administración de este medicamento, no es probable que se produzcan cuadros de sobredosis.
En caso de sobredosis o de ingesta accidental, contacte a su médico, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Si olvidó usar Dioxaflex Complex
No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, Dioxaflex Complex puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Informe a su médico si sufre alguno de los siguientes efectos adversos:
Los efectos adversos que se han notificado con el uso de Diclofenaco son los siguientes:
Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): dolor de cabeza, mareos, vértigo, náuseas, vómitos, diarrea, indigestión o sensación de acidez, dolor abdominal, flatulencia, disminución del apetito, alteraciones en los resultados de los análisis de sangre que evalúan el funcionamiento del hígado (aumento de enzimas del hígado), erupción en la piel, reacción de induración o dolor en el lugar de la inyección.
Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): palpitaciones, dolor en el pecho repentino (síntomas de infarto de miocardio o de un ataque al corazón), respiración entrecortada, dificultad para respirar acostado, hinchazón de pies y piernas (signos de insuficiencia cardíaca). Deje de usar Dioxaflex Complex y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas.
Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas): hinchazón en la cara, ojos, o lengua, dificultad para tragar, silbidos, ronchas y picazón generalizado, erupción en la piel, fiebre, dolor abdominal, molestias u opresión en el pecho, dificultad para respirar, mareos, disminución de la presión arterial, desmayo (reacción alérgica grave). Dolor de estómago, diarrea con sangre, úlcera gástrica o intestinal con o sin sangrado o perforación (vómitos de sangre y aparición de sangre en heces). Hepatitis con o sin coloración amarillenta. Deje de usar Dioxaflex Complex y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas.

Otros efectos adversos raros: somnolencia, asma, alteración de la función del hígado, picazón, erupción de la piel, aparición de ronchas (urticaria), retención de líquidos con hinchazón (edema), aparición de una costra negra en la piel en el sitio de aplicación.
Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10000 personas): signos o síntomas de disminución de algunos tipos de células de la sangre como cansancio, dolor de cabeza, falta de aire al hacer ejercicio, mareos, palidez (anemia), infecciones frecuentes con fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras en la boca (leucopenia), sangrados o aparición de moretones (trombocitopenia). Meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro) con síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, rigidez del cuello o sensibilidad extrema a la luz brillante. Dificultad para respirar, silbidos (neumonitis). Dolor intenso en la parte alta del abdomen, náuseas, vómitos y pérdida de apetito (signos de pancreatitis). Reacciones graves en la piel con erupción, enrojecimiento, ampollas en los labios, boca u ojos, descamación de la piel, acompañado de fatiga, nauseas, pérdida de apetito, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, tos o dolor en el cuerpo (síndrome de Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica). Anomalías del funcionamiento de los riñones que provocan hinchazón en pies o piernas y disminución súbita de la cantidad de orina (insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial, necrosis papilar renal), sangre en orina (hematuria), espuma en orina (proteinuria, síndrome nefrótico). Deje de usar Dioxaflex Complex y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas.
Otros efectos adversos muy raros: hinchazón en la cara. Desorientación, depresión, insomnio, pesadillas, irritabilidad, reacciones psicóticas (excitabilidad, alucinaciones, delirios). Sensación de hormigueo, trastornos de la memoria, convulsiones, ansiedad, temblor, trastornos del gusto, accidente cerebrovascular (ACV). Alteraciones visuales, visión borrosa, visión doble. Zumbidos en los oídos. Hipertensión (presión arterial alta), vasculitis (inflamación de las paredes de los vasos). Empeoramiento de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Constipación, hinchazón de la lengua (glositis), inflamación de la mucosa de la boca (estomatitis), problemas para tragar (alteración esofágica). Erupción generalizada (eczema), enrojecimiento (eritema y eritema multiforme), descamación de la piel (dermatitis exfoliativa), pérdida de cabello, alergia al sol (reacción de fotosensibilidad), aparición de moretones (púrpura), picazón. Infección en el lugar de la inyección.
Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles): cólicos abdominales leves y dolor abdominal a la palpación que comienza poco después de iniciar el tratamiento seguido de sangrado rectal o diarrea con sangre observadas normalmente dentro de las 24 horas posteriores a la aparición del dolor abdominal. Lesión (necrosis) de los tejidos en el lugar de inyección.
Casos aislados: anomalías en el funcionamiento del hígado que provocan coloración amarillenta en piel y blanco de los ojos, fiebre, dolor abdominal y moretones (insuficiencia hepática, hepatitis fulminante, necrosis hepática). Deje de usar Dioxaflex Complex y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas.

Los efectos adversos que se han notificado con el uso de Tiamina, Piridoxina, Hidroxocobalamina son los siguientes:
Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): cansancio, mareo y dolor de cabeza.
Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): dificultad para coordinar los movimientos.
Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): náuseas, vómitos. Erupción en la piel, aparición de ronchas (urticaria). Dolor, picazón, erupción, quemazón o endurecimiento del sitio de administración. Sensación de hinchazón en todo el cuerpo. Reacciones anafilácticas (alérgicas) con la inyección de Hidroxocobalamina y Tiamina, con síntomas como dificultad respiratoria grave (distres respiratorio), picazón, inquietud, sudor, aumento de los latidos del corazón, disminución de la presión arterial; otros síntomas más graves, como rápida hinchazón de la piel y mucosas (angioedema o reacción similar). Deje de usar Dioxaflex Complex y consulte inmediatamente con su médico si advierte estos síntomas. La administración repetida de Tiamina puede provocar recaídas en reacciones alérgicas de la piel (dermatitis de contacto) en personas alérgicas a esta vitamina.
Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas): picazón, erupción en la pi el, ronchas rojo-rosadas acompañadas de quemazón o picazón (urticaria).
Efectos adversos de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): se podría producir al comienzo de la administración parenteral afectación de la función del corazón y dificultad para respirar por acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar).
Se ha informado de la aparición de algún caso de alteración en el número de plaquetas o glóbulos rojos de la sangre. El tratamiento por inyección intramuscular puede enmascarar signos de policitemia vera; esta condición puede estar suprimida en presencia de déficit de Vitamina B12.
En tratamiento prolongado con Piridoxina pueden producirse mareos, agitación, hormigueos y disminución de la sensibilidad (alteraciones en el tacto), entumecimiento en pies y manos y alteraciones al caminar, que generalmente disminuyen al interrumpirse el tratamiento. Insomnio. Con altas dosis de Piridoxina puede observarse afectación de la memoria, dependencia y síndrome de abstinencia. Hinchazón, irritación, enrojecimiento en los ojos. Empeoramiento de la enfermedad de Leber (enfermedad hereditaria que provoca pérdida de visión).Cambios en el color y olor de la orina. Goteo nasal, resfriado común o dolor de garganta. Molestias digestivas como molestias abdominales, diarrea transitoria moderada, pérdida del apetito. Grandes dosis de Piridoxina pueden producir sensibilidad a la luz solar, con aparición de ampollas, erupción o picazón. Se ha dado algún caso de afección con nódulos y pus en la cara y el cuello. Se ha informado de casos individuales de acné o eczema (erupción en la piel) tras altas dosis de Vitamina B12 en inyección. La Piridoxina administrada a madres en periodo de lactancia puede suprimir la salida de leche, producir dolor y aumento del tamaño de las mamas. Ansiedad o nerviosismo.

5. CONSERVACIÓN DE DIOXAFLEX COMPLEX

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 ºC. No conservar en heladera.
No utilice Dioxaflex Complex después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Dioxaflex Complex
Los principios activos son Diclofenaco Sódico, Tiamina Clorhidrato (Vit. B1), Piridoxina Clorhidrato (Vit. B6) e Hidroxocobalamina (como Hidroxocobalamina Sulfato) (Vit. B12). Cada frasco-ampolla contiene: Tiamina Clorhidrato (Vit. B1) 100 mg, Piridoxina Clorhidrato (Vit. B6) 100 mg, Hidroxocobalamina (como Hidroxocobalamina Sulfato) (Vit. B12) 9,934 mg (*).
Cada ampolla contiene: Diclofenaco Sódico 75 mg. Los demás componentes de la formulación son: Polietilenglicol, Agua para Inyectables c.s.p. 3 ml.
(*) 9,934 mg de Hidroxocobalamina equivalen a 10,000 mg de Cianocobalamina

Aspecto del producto y contenido del envase
Cada envase contiene 3 frascos-ampolla con polvo y 3 ampollas con solvente.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, DIOXAFLEX COMPLEX DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional o ante cualquier duda referida a la seguridad del producto comunicarse con Laboratorios Bagó – Información de Productos, Dirección Médica: infoproducto@bago.com.ar – 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 55.669.
Información para el paciente autorizada por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 11.232/17.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/ o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

Bagó

Ética al servicio de la salud