

# Septicide 500 Ciprofloxacino 500 mg

Comprimidos Recubiertos

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA ARCHIVADA



Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
  - Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
  - Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

- Contenido de la información para el paciente
1. QUÉ ES SEPTICIDE Y PARA QUÉ SE UTILIZA
  2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR SEPTICIDE
  3. CÓMO USAR SEPTICIDE
  4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
  5. CONSERVACIÓN DE SEPTICIDE
  6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

## 1. QUÉ ES SEPTICIDE Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Septicide contiene el principio activo Ciprofloxacino el cual es un antibiótico de amplio espectro del grupo de las fluoroquinolonas.

Los antibióticos como Ciprofloxacino se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no son adecuados para tratar otro tipo de infecciones como las virales.

Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

### Adultos

Septicide está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a Ciprofloxacino, tales como:

- Infecciones de las vías respiratorias bajas causadas por bacterias gramnegativas (exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones broncopulmonares en la fibrosis quística o en la bronquiectasia, neumonía).
- Infecciones del oído o sinusales de larga duración o recurrentes (otitis media supurativa crónica, otitis maligna externa, exacerbación aguda de sinusitis crónica, especialmente si ésta es causada por bacterias gramnegativas).
- Infecciones de las vías urinarias.
- Infecciones del tracto genital masculino y femenino (uretritis y cervicitis gonocócicas causadas por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, orquiepididimitis incluyendo casos causados por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, enfermedad inflamatoria pélvica incluyendo casos causados por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*).
- Infecciones del tracto gastrointestinal (por ejemplo diarrea del viajero).
- Infecciones intraabdominales.
- Infecciones de la piel y tejidos blandos causadas por bacterias gramnegativas.
- Infecciones de los huesos y de las articulaciones.
- Profilaxis (prevención) de infecciones invasivas causadas por la bacteria *Neisseria meningitidis*.
- Carunco por inhalación (profilaxis post-exposición y tratamiento curativo).
- Ciprofloxacino puede utilizarse en el tratamiento de la neutropenia febril (fiebre asociada a bajos niveles de glóbulos blancos en la sangre), con sospecha de infección bacteriana.

En caso de que sufra una infección grave o si la infección es causada por más de un tipo de bacteria, es posible que le administren un tratamiento antibiótico adicional, además de Ciprofloxacino.

Septicide se debe utilizar cuando se haya establecido claramente la relación riesgo-beneficio para cada indicación, particularmente cuando hubieran opciones alternativas de tratamiento para las siguientes infecciones:

- Exacerbación aguda de bronquitis crónica.
- Sinusitis aguda.
- Cistitis aguda no complicada.

### Niños y adolescentes

Septicide está indicado en niños y adolescentes para el tratamiento de infecciones causadas por las cepas de microorganismos sensibles a Ciprofloxacino tales como:

- Infecciones pulmonares y de bronquios en niños y adolescentes que padecen una enfermedad llamada fibrosis quística causada por la bacteria *Pseudomonas aeruginosa*.
- Infecciones complicadas de las vías urinarias, incluidas las infecciones que han alcanzado los riñones (pielonefritis)
- Carunco por inhalación (profilaxis después de la exposición y tratamiento curativo).

Ciprofloxacino también puede utilizarse para el tratamiento de infecciones graves en niños y en adolescentes cuando su médico lo considere necesario.

## 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR SEPTICIDE

### No tome Septicide si:

- Es alérgico a Ciprofloxacino u otros antibióticos del grupo de las quinolonas o a cualquiera de los demás componentes del producto.
- Tiene antecedentes de problemas en los tendones debido a fluoroquinolonas (como tendinitis o ruptura tendinosa).
- Se encuentra en tratamiento con tizanidina (un medicamento utilizado como relajante muscular).
- Está embarazada o amamantando (salvo que suspenda la lactancia).

Si algo de lo anterior se cumple en su caso, no tome Septicide. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

### Consulte a su médico antes de empezar a tomar Septicide si:

- Se encuentra bajo tratamiento con corticoides o ha recibido un trasplante de riñón, pulmón o corazón, especialmente si es mayor de 60 años de edad.
- Padece alguna enfermedad que afecte los tendones (tejido que conecta los músculos con el hueso) y/o articulaciones como la artritis reumatoidea.
- Padece o ha padecido inflamación de los tendones (tendinitis) o ruptura tendinosa.
- Padece o ha padecido neuropatía periférica (enfermedad que afecta a los nervios pudiendo producir manifestaciones motoras como debilidad muscular o afectación sensitiva manifestándose como disminución de la sensibilidad al tacto, presión, temperatura o vibración, ardor, quemazón, hormigueo o dolor).
- Padece o ha padecido epilepsia, convulsiones u otras enfermedades que pueden aumentar el riesgo de presentar convulsiones, como arterioesclerosis cerebral severa, reducción del flujo sanguíneo cerebral, tumor cerebral o antecedentes de accidente cerebrovascular.
- Padece miastenia *gravis* (una enfermedad caracterizada por la debilidad muscular) o tiene historia familiar de esta enfermedad ya que los síntomas pueden ser exacerbados.
- Se encuentra en tratamiento con antiarrítmicos (utilizados para tratar trastornos en el ritmo del corazón como quinidina, procainamida, amiodarona, sotalol), antidepressivos tricíclicos y antipsicóticos (para el tratamiento de la depresión y otros problemas de la salud mental) o macrólidos (antibióticos usado para infecciones por microorganismos).
- Padece o ha padecido problemas del corazón como insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, ritmo lento (bradicardia) o prolongación del intervalo QT, un parámetro que se mide en el electrocardiograma.
- Sabe que presenta niveles bajos de magnesio o potasio en la sangre.
- Presenta problemas en los riñones o el hígado. Si tiene problemas de riñón es probable que su médico modifique la dosis de Septicide.
- Padece diabetes y se encuentra en tratamiento con medicamentos hipoglucemiantes orales o insulina.
- Usted o un miembro de su familia tiene deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) ya que podría tener riesgo de padecer anemia al tomar Ciprofloxacino.

### Información importante sobre los componentes de Septicide

Este medicamento contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar Septicide.

### Uso de Septicide con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica (antiácidos que contienen magnesio, aluminio o calcio, multivitamínicos y/o hierro) o derivados de hierbas.

Antes de tomar Septicide, informe siempre a su médico si está usando o recibiendo alguno de los siguientes medicamentos: teofilina (para el tratamiento del asma, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica); cafeína; zolpidem (para los problemas del sueño); duloxetina, clozapina, olanzapina, agomelatina (para la depresión y el tratamiento de distintas enfermedades mentales), antidiabéticos orales, fenitoína (para el tratamiento de convulsiones o problemas del ritmo del corazón), ciclosporina (para trasplantes de órganos o algunas enfermedades autoinmunes), metotrexato (para ciertos tipos de cáncer, psoriasis, artritis reumatoidea), anticoagulantes (para evitar la formación de coágulos en la sangre), ropinirol (para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson), tizanidina (para la espasticidad muscular en la esclerosis múltiple), antiinflamatorios no esteroideos (para el tratamiento del dolor y la inflamación), sildenafil (para los problemas en la erección), probenecid (para una enfermedad que afecta las articulaciones llamada gota), metoclopramida (para las náuseas y vómitos), lidocaína (para enfermedades del corazón o uso como anestésico), pentoxifilina (para trastornos circulatorios).

Informe a su médico si estuviera usando: sucralfato (para el tratamiento y prevención de la gastritis o úlceras gastrointestinales), antiácidos, omeprazol, suplementos minerales, un quelante polimérico de fosfatos (por ejemplo, sevelamero o carbonato lantano), medicamentos o suplementos que contienen calcio, magnesio, aluminio o hierro. Si estos preparados son imprescindibles tome Ciprofloxacino aproximadamente dos horas antes o cuatro horas después de que haya tomado estos preparados.

Consulte a su médico antes de tomar cualquier otro medicamento.

### Toma de Septicide con alimentos y bebidas

Aunque tome Ciprofloxacino con las comidas, no debe comer ni beber ningún producto lácteo (como leche o yogur) ni bebidas con calcio añadido cuando tome los comprimidos, ya que pueden afectar a la absorción del principio activo.