

1695



# Bil 13 enzimático

ÁCIDO DEHIDROCÓLICO 100 mg  
METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg  
PANCREATINA 180 mg  
SIMETICONA 50 mg

**Digestivo - Antiflatulento**

## Comprimidos Recubiertos

### FÓRMULA

Cada Comprimido Recubierto contiene: Ácido Dehidrocólico 100 mg, Metoclopramida Clorhidrato 10 mg, Pancreatina 180 mg, Simeticona 50 mg. Excipientes: Povidona; Anhidrido Silícico Coloidal; Carboximetilcelulosa Reticulada; Estearato de Magnesio; Celulosa Microcristalina; Lactosa; Laca Aluminica Azul Brillante Amarillo de Quinolina D&C Yellow 10; Talco; Acetofato de Polivinilo; Ácido Esteárico; Dióxido de Titanio; Citrato de Trietilo.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Normorregulador digestivo.

### POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación para adultos se aconseja:

**1 comprimido antes o durante las comidas.**

### CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Como con todo medicamento, no se aconseja la utilización del producto durante el embarazo y la lactancia, hasta tanto los estudios pertinentes demuestren la total inocuidad sobre tales estados.

#### Interacciones

Se han descrito interacciones medicamentosas solo para la Metoclopramida:

- Neurolepticos: existe sinergia de efectos a nivel del sistema nervioso central.
- Anticolinergicos: disminuyen la acción de la Metoclopramida sobre la motilidad gastrointestinal.
- Antiparkinsonianos: posible inhibición de la acción de los mismos.
- Digoxina: su absorción puede llegar a disminuir.
- Levodopa, paracetamol: su absorción puede llegar a aumentar.



1695



## REACCIONES ADVERSAS

A las dosis terapéuticas recomendadas, el medicamento es generalmente bien tolerado. En pacientes hipersusceptibles, la Metoclopramida puede llegar a provocar trastornos leves tales como somnolencia, lasitud, vértigos, cefalea, insomnio, diarrea. Muy raramente, sobre todo en sujetos jóvenes, pueden llegar a presentarse síntomas extrapiramidales (espasmos faciales, movimientos involuntarios, torticolis) que desaparecen espontáneamente o con la suspensión del tratamiento.

En casos de tratamientos muy prolongados con Metoclopramida, la bibliografía registra la aparición de disquinesias tardías, efectos endocrinos (amenorrea, galactorrea, ginecomastia, hiperprolactinemia) y trastornos depresivos.

## ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS

A las dosis aconsejadas, no han sido descriptos.

## SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente al médico, aún si no se observara síntoma o signo alguno de intoxicación.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

## PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 30 Comprimidos Recubiertos redondos, lisos, color celeste.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original.**

**AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BIL 13 ENZIMÁTICO DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro. 19.895.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disposición Nro. 2268/94.

## LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

**Bagó**

51005368