



CEFALEX VL

DEXIBUPROFENO 300 miligramos

Analgésico. Antiinflamatorio. Antifebril.
DOLOR de CABEZA

Comprimidos Recubiertos
Industria Argentina
VL Venta Libre

FÓRMULA: cada Comprimido Recubierto contiene: Dexibuprofeno 300 miligramos. Excipientes: Hipromelosa; Anhídrido Silícico Coloidal; Carboximetilcelulosa Cálcica; Talco; Dióxido de Titanio; Triacetina; Polietilenglicol; Celulosa Microcristalina.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico. Antiinflamatorio. Antifebril.

No utilice este medicamento si el envase de los comprimidos (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, **CEFALEX VL** no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

USO DEL MEDICAMENTO

LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

CEFALEX VL contiene Dexibuprofeno, la parte activa del Ibuprofeno, un analgésico antiinflamatorio y antifebril, indicado para el alivio temporario de: dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, fiebre, dolores del resfrío y la gripe, dolores menstruales, dolores de dientes, dolores en las articulaciones, dolores de la artritis y la artrosis.

CÓMO USAR CEFALOX VL

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 Comprimido Recubierto de **CEFALEX VL** cada 8 ó 12 horas.

- No ingerir más de 3 Comprimidos Recubiertos en el día (900 mg de Dexibuprofeno/día).
- No ingerir por más de 10 días para alivio del dolor o por más de 3 días para bajar la fiebre, sin consulta médica.


CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia al Dexibuprofeno, aspirina, otros analgésicos-antiinflamatorios o a algún otro componente de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Consulte a su médico:

- Si el dolor o la fiebre persisten o se agravan, si se presentan nuevos síntomas o si el área dolorida está roja o hinchada.

- 
- Si Ud. toma medicamentos con ácido acetilsalicílico o paracetamol (aunque el Dexibuprofeno tiene las mismas indicaciones, no deben administrarse juntos, excepto bajo supervisión médica).
 - Antes de administrar analgésicos-antiinflamatorios a niños menores de 12 años.
 - Antes de tomar analgésicos-antiinflamatorios, incluido el Dexibuprofeno, si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca, si Ud. generalmente toma 3 ó más vasos de bebidas alcohólicas por día.
- Si usted está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

EVENTOS ADVERSOS

Náuseas, vómitos, diarrea.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 Comprimidos Recubiertos redondos, lisos, color blanco.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **CEFALEX VL** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 44.963.
Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 4462/06.



Laboratorios Bagó S.A.
Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.
www.bago.com

50999378

VL VENTA LIBRE
Industria Argentina

www.cefalex.com.ar
www.bagoconsumomasivo.com.ar

Bagó

Código	50999378	Dto. de Documentación
Programa: Illustrator CS3 Impresión al 100% Material: prospecto		
Tintas:	 pantone Violet C  CMYK	Bagó
Observaciones: Control dimensional, remitirse a plano correspondiente.		