



Bagó

DUPLICADO



Inciso D.-

Proyecto de folleto interior de envase.-

BAGO B1 B6 B12 10.000 - INYECTABLE LIOFILIZADO

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Contenido por unidad de venta: Envases conteniendo 3, 6, 10 y 50 frasco-ampollas con droga activa liofilizada y 3, 6, 10 y 50 ampollas con solvente, siendo esta última presentación para Uso Hospitalario.

Fórmula cuali-cuantitativa:

Cada frasco-ampolla contiene:

Hidroxocobalamina	10.000	mcg
Clorhidrato de Tiamina	100	mg
Clorhidrato de Piridoxina	200	mg

Cada Ampolla contiene:

Clorhidrato de Lidocaína	20	mg
Citrato de Sodio	10	mg
Acido Citrico	4	mg
Metilparabeno	2,5	mg
Propilparabeno	0,625	mg
Poliethylenglicol 400	0,25	ml
Alcohol	0,125	ml
Agua Destilada Esterilizada ... c.s.p. ...	2,5	ml

Acción Terapéutica:

Vitaminico. Antianémico. Neurotrófico. Antiálgico.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

DR. MARIO A. LOS
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO (UBA)
APODERADO

4

JULIO C. MARANGONI
DIRECTOR TÉCNICO
FARMACÉUTICO
MAT. 7729

LABORATORIOS BAGÓ S.A.
NADINA M. HERNÁNDEZ
FARMACÉUTICA
A.L. 11.032

JUAN MANUEL APELLA
FARMACÉUTICO - M.P. 17015
DIRECTOR TÉCNICO



DUPLICADO



Posología y forma de administración:

La dosis varía de acuerdo con el criterio médico y el cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación, se aconseja:

1 - 2 frasco-ampollas por día, por vía intramuscular profunda exclusivamente.

Acciones colaterales y secundarias:

A las dosis recomendadas, el medicamento es bien tolerado y no se producen efectos colaterales o secundarios. No se han descrito para sus principios activos, signos de hipervitaminosis luego de utilización por largo tiempo de dosis elevadas.

Solamente en personas hipersusceptibles, la administración de Tiamina (Vitamina B₁) por vía intravenosa y eventualmente por vía intramuscular, puede llegar a provocar reacciones anafilactoides que obliguen a suprimir el tratamiento.

Precauciones y Advertencias:

A las dosis terapéuticas, no presenta.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia a la Tiamina, Lidocaina o a alguno de los componentes de la formulación.

Antagonismos y Antidotismos:

A las dosis aconsejadas, no se han descrito.

Interacciones:

Tiamina (Vitamina B₁): la Tiosemicarbezona y el 5-Fluorouracilo anulan su acción. Los antiácidos inhiben su

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

DR. MARIO A. LOS
BIOQUÍMICO - FARMACEUTICO URUG
APODERADO

-5-

JULIO C. MARANGONI
DIRECTOR TÉCNICO
FARMACEUTICO
MAT. 7729


LABORATORIOS BAGÓ S.A.
NADINA M. HAY TUK
FARMACEUTICA
MAT. 11.932

Juan Manuel Apella
LABORATORIOS BAGÓ S.A.
FARMACEUTICO - MAT. 12.916



Bago

DUPLICADO



piridoxina (Vitamina B₆): administrada simultáneamente con medicamentos que contengan levodopa, acelera la metabolización de ésta última, inhibiendo su efecto.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BAGO B₁ B₆ B₁₂ 10.000 DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LABORATORIOS BAGO S.A.

Calle 4 N° 1429

T.E.: 21-1946

La Plata

Director Técnico:

Julio César Marangoni

Farmacéutico

Administración:

Bernardo de Irigoyen 248

T.E.: 334-9081

Buenos

Aires

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio
de Salud y Acción Social

Certificado N°: 33.230

LABORATORIOS BAGO S.A.

DR. MARIO A. LOS
BIOQUÍMICO - FARMACÉUTICO (UBA)
APODERADO

-6

JULIO C. MARANGONI
DIRECTOR TÉCNICO
FARMACÉUTICO
MAT. 7729

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. HERNÁNDEZ
FARMACÉUTICA
MAT. 11.832

JUAN MANUEL APELLA
FARMACÉUTICO - M.P. 17015
DIRECTOR TÉCNICO