

PROYECTO DE PROSPECTO

Bagóvit AE
Vitamina A Palmitato 600.000 U
Vitamina E Acetato 50 mg
Alantoína 250 mg
Crema

Industria Argentina
VL VENTA LIBRE
Uso Externo



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO

Conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

¿QUÉ CONTIENE BAGÓVIT AE?

Cada 100 g de Crema contienen: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 600.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Poliacrilato de Sodio, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Lanolina, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona Volátil, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Edetato Sódico, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

Este Medicamento es Libre de Gluten.

ACCIÓN:

Protectora, hidratante y regeneradora de la piel.

¿PARA QUÉ SE USA BAGÓVIT AE?

Se usa para el alivio local de las raspaduras, dermatitis, enfermedades inflamatorias superficiales que afectan principalmente la capa más externa de la piel (eczemas e irritaciones menores).



¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR BAGÓVIT AE?

No use este medicamento si Ud. Sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 2 años sin supervisión médica.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE?

Dada la sensibilidad de la piel o si las lesiones son muy extensas se deben evitar las compresas o la cobertura parcial o total con materiales impermeables o el exceso de aplicaciones dado que se pueden presentar efectos de sobredosificación por reabsorción de la vitamina A.

Utilizar con cuidado cerca de los ojos.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO BAGÓVIT AE?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Debido a que existe cierta absorción a través de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir efectos indeseables solamente aumentan cuando la superficie sobre la que se aplica es extensa, se emplean vendas, la piel está dañada (particularmente quemada) o se trata de mucosas (capas húmedas que recubren una cavidad abierta al exterior o un conducto del cuerpo; ejemplo mucosa nasal). Debe tenerse en cuenta que en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas extensas y con la piel muy dañada, si bien no es lo habitual, podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis (trastornos provocados por el exceso de una vitamina) como la que se observa con la administración oral de Vitamina A.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Aplicar sobre la zona a tratar 2 ó 3 veces por día, según se requiera.

No colocar más de 3 veces por día, no aplicar por tiempo prolongado (no más de 2 meses).

Ante la aparición de nuevos síntomas o de no remitir la sintomatología inicial consultar con su médico inmediatamente.

Bagóvit AE Crema no contiene parabenos.

¿QUÉ DEBO HACER SI UTILICÉ UNA CANTIDAD EXCESIVA, O SI COLOQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.



PRESENTACIONES: Envases conteniendo 50, 100, 150 y 200 g.

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

<https://consumomasivo.bago.com.ar/>

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.
Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina Mariana
CUIL 27205366208



Ética al servicio de la salud
Ética al servicio de la salud

PROYECTO DE PROSPECTO

Bagóvit AE
Vitamina A Palmitato 500.000 U
Vitamina E Acetato 50 mg
Alantoína 250 mg
Emulsión

Industria Argentina
VL VENTA LIBRE
Uso Externo



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO

Conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

¿QUÉ CONTIENE BAGÓVIT AE?

Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 500.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Poliacrilato de Sodio, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Edetato Sódico, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

Este Medicamento es Libre de Gluten.

ACCIÓN:

Protectora, hidratante y regeneradora de la piel.

¿PARA QUÉ SE USA BAGÓVIT AE?

Se usa para el alivio local de las raspaduras, dermatitis, enfermedades inflamatorias superficiales que afectan principalmente la capa más externa de la piel (eczemas e irritaciones menores).



¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR BAGÓVIT AE?

No use este medicamento si Ud. Sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 2 años sin supervisión médica.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE?

Dada la sensibilidad de la piel o si las lesiones son muy extensas se deben evitar las compresas o la cobertura parcial o total con materiales impermeables o el exceso de aplicaciones dado que se pueden presentar efectos de sobredosificación por reabsorción de la vitamina A.

Utilizar con cuidado cerca de los ojos.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO BAGÓVIT AE?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Debido a que existe cierta absorción a través de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir efectos indeseables solamente aumentan cuando la superficie sobre la que se aplica es extensa, se emplean vendas, la piel está dañada (particularmente quemada) o se trata de mucosas (capas húmedas que recubren una cavidad abierta al exterior o un conducto del cuerpo; ejemplo mucosa nasal). Debe tenerse en cuenta que en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas extensas y con la piel muy dañada, si bien no es lo habitual, podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis (trastornos provocados por el exceso de una vitamina) como la que se observa con la administración oral de Vitamina A.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Aplicar sobre la zona a tratar 2 ó 3 veces por día, según se requiera.

No colocar más de 3 veces por día, no aplicar por tiempo prolongado (no más de 2 meses).

Ante la aparición de nuevos síntomas o de no remitir la sintomatología inicial consultar con su médico inmediatamente.

Bagóvit AE Emulsión no contiene parabenos.

¿QUÉ DEBO HACER SI UTILICÉ UNA CANTIDAD EXCESIVA, O SI COLOQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.



PRESENTACIONES: Envases conteniendo 100, 200 y 400 ml de Emulsión. Envase con bomba dosificadora conteniendo 400 ml de Emulsión.

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

<https://consumomasivo.bago.com.ar/>

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.
Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro.



Ética al servicio de la salud

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina Mariana
CUIL 27205366208



Ética al servicio de la salud
Ética al servicio de la salud