



PROYECTO DE PROSPECTO INTERIOR DE ENVASE.-

Nombre del Producto; LEUCOTROFINA
TIMOMODULINA

Forma Farmacéutica: Inyectable

Solución Oral en Frasco-Ampolla

Industria Argentina

Condición de Expendio: Venta Bajo Receta

Vencimiento: 24 meses para ambas presentaciones

Presentación:

Inyectable: Envases conteniendo 10 y 100 Ampollas, siendo esta última presentación para Uso Hospitalario.-

Solución Oral en Frasco-Ampolla: Envases conteniendo 10 y 100 Frascos-Ampolla, siendo esta última presentación para Uso Hospitalario.-

Fórmula cuali-cuantitativa:


Inyectable:

Cada Ampolla contiene:

Timomodulina.....	20,00 mg
Glicerina.....	220,00 mg
Metilparabeno	7,00 mg
Propilparabeno	3,00 mg

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. HRYCIUK
FARMACÉUTICA
Ma. 11.832

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. HRYCIUK
CO-DIRECTORA TÉCNICA
FARMACÉUTICA
Ma. 11.832



Bago



Cloruro de Sodio 17,00 mg

Agua para Inyectables c.s.p. 2,00 ml

Solución Oral en Frasco-Ampolla:

Cada Frasco-Ampolla contiene:

Timomodulina 60,00 mg

Glicerina 750,00 mg

Sorbitol 70% 7.500,00 mg

Alcohol 0,75 ml

Ácido Cítrico 22,50 mg

Esteres del Ácido p-aminobenzoico 15,00 mg

Esencia de Frutilla 0,08 ml

Agua Purificada c.s.p. 15,00 ml


Acción Terapéutica:

Inmunoestimulante. Coadyuvante en enfermedades infecciosas, virales y bacterianas.-

Indicaciones:

Terapia de los síndromes leucopénicos primarios (generalmente uno de los aspectos del síndrome pancitopénico), secundario a agentes mielotóxicos (roentgen-terapia, cobalto-terapia, betatron, quimioterapia citostática) o inmunoalergizantes. Déficit de la formación de anticuerpos.

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. CHRYCIUK
FARMACEUTICA
Ma 11 832



LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. CHRYCIUK
CO-DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA
Ma 11 832

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. CHRYCIUK
CO-DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA
Ma 11 832



Posología y Administración:

Dosis terapéutica usual mínima y máxima por toma y día.

Vía Oral: Un Frasco-Ampolla al día, separado de las comidas.

Para uso pediátrico la dosis debe ser oportunamente reducida en función del peso y la edad.

Inyectable: una Ampolla al día por vía intramuscular pudiendo aumentar a 2 Ampollas al día en casos de leucopenia grave.

Acciones colaterales y secundarios. Precauciones. Advertencias y Contraindicaciones.-

Puede provocar dolor en el sitio de la inyección que desaparece rápidamente.

Excepcionalmente se han observado fenómenos alérgicos en pacientes sensibilizados contra proteínas bovinas, por lo que debe ejercerse precaución al tratar pacientes con hipersensibilidad a las mismas. Si se desarrolla reacción alérgica, debe suspenderse el tratamiento.

Usar con precaución en enfermedades autoinmunes.

Efectos Tóxicos:

No posee.-


Antagonismos y Antidotismos:

No posee.-

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO LEUCOTROFINA DEBE

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. HRYCZUK
FARMACÉUTICA
Ma. 11.832

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. HRYCZUK
CO-DIRECTORA TÉCNICA
FARMACÉUTICA
Ma. 11.832



SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LABORATORIOS BAGO S.A:

Calle 4 N°1429

T.E: (0221) 425-9550

La Plata

Director Técnico:

Juan Manuel Apella

Farmacéutico

Administración:

Bernardo de Irigoyen 248

T.E: (011) 4344-2000

Buenos Aires

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N°: 38.457

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. HRYCIUK
FARMACEUTICA
M.E. 11.832

LABORATORIOS BAGO S.A.
NADINA M. HRYCIUK
CO-DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA
M.E. 11.832