

PROYECTO DE PROSPECTO PARA EL USUARIO

Dioxaflex VL **Diclofenac Dietilamina 2,32 %** **Gel** **Uso tópico**

Industria Argentina
VL VENTA LIBRE



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE DIOXAFLEX VL?

Cada 100 gramos de gel contienen: Diclofenac Dietilamina 2,320 gramos. Excipientes: Carboxipolimetileno; Propilenglicol; Alcohol Isopropílico; Dietilamina; Dietilenglicol Monoetileter; Alcohol Cetoestearílico Etoxilado; Vaselina líquida; Triglicéridos de Ácidos Grasos; Perfume Lavanda; Agua Purificada.

Este Medicamento es Libre de Gluten.

ACCIONES

Analgésico. Antiinflamatorio de uso tópico.

¿PARA QUÉ SE USA DIOXAFLEX VL?

Dioxaflex VL se utiliza para el alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por afecciones reumáticas, articulares (lumbalgia, tortícolis), golpes, distensiones musculares y/o tendinosas, torceduras.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR DIOXAFLEX VL?

No utilice **Dioxaflex VL** si Usted:

- es alérgico al Diclofenac u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos utilizados para el tratamiento del dolor, fiebre o inflamación, como, por ejemplo: ibuprofeno, aspirina o cualquier otro ingrediente contenido en este producto.

Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico.

Síntomas de una reacción alérgica a estos medicamentos pueden incluir:

- sibilancia o dificultad para respirar (asma),
- erupción cutánea con ampollas o urticaria,

PP DIX VLG Gel V01

1

Bagó
Ética al servicio de la salud



- hinchazón de la cara o lengua,
- secreción nasal.
- está cursando los últimos 3 meses de embarazo, ya que podría causar daño a su bebé o causar problemas al momento del parto.
- es menor de 14 años.

Si Usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No aplique sobre la piel que presente: cortes, heridas abiertas o piel que tenga un sarpullido o eczema. Discontinúe el tratamiento si desarrolla un sarpullido en la piel después de aplicar el producto.

No utilice más producto que el indicado o por un periodo de tiempo mayor al indicado en este prospecto, a menos que haya sido indicado por su médico.

No utilice en la boca. No ingiera. Lave sus manos después del uso. Tenga cuidado de no introducir este medicamento en sus ojos. Si esto sucede, enjuague bien sus ojos con agua limpia.

Consulte con su médico o farmacéutico si alguna molestia persiste.

Puede usar rodillera, codera o vendas de las comúnmente utilizadas para lesiones como esguinces, colocándolas una vez que el producto se haya absorbido. No utilice debajo de vendajes herméticos (plásticos).

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Dioxaflex VL no debe usarse después de la fecha de vencimiento que aparece en el dorso del envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO DIOXAFLEX VL?

Cuando utiliza este medicamento Usted puede experimentar: erupción cutánea con o sin ampollas, urticaria, sibilancias, dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta; picazón o enrojecimiento de la piel. La piel puede ser más sensible a la luz solar (sol o cama solar). Algunos de los posibles signos son quemaduras solares con picazón, hinchazón y ampollas.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración: Tópica - para uso solamente en la piel.

Adultos y niños mayores de 14 años: aplique **Dioxaflex VL** Gel 2 veces al día (mañana y noche) sobre el área afectada frotando suavemente hasta su absorción para obtener un alivio duradero, hasta por 12 horas.

Frote suavemente una pequeña cantidad de gel en la piel donde tenga dolor o inflamación. La cantidad necesaria puede variar dependiendo del tamaño del área dolorida o inflamada.

Luego de la aplicación:

- Limpie sus manos, por ejemplo, con un papel absorbente y luego lávelas, a excepción de que las manos sean el lugar de tratamiento. Luego de su uso, el papel absorbente o elemento utilizado debe ser tirado a la basura.
- Espere hasta que **Dioxaflex VL** Gel se seque antes de ducharse o bañarse.



No utilice por más de:

- 2 semanas para lesiones musculares y articulares (por ejemplo: esguinces, distensiones, moretones) o tendinitis,
 - 3 semanas para dolor de artrosis,
- sin consultar a un médico o farmacéutico.

Utilice no más de lo requerido durante el menor período de tiempo necesario.

Si el dolor o la inflamación no mejoran dentro de los 7 días o si empeoran, consulte con su médico.

¿QUÉ DEBO HACER SI UTILICÉ UNA CANTIDAD EXCESIVA, O SI INGERÍ EL PRODUCTO?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACIONES

Envases que contienen 30 y 50 gramos de gel.

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

www.consumomasivo.bago.com.ar

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 56.264.
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro.



Ética al servicio de la salud

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19. Argentina.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

PP DIX VLG Gel V01

3



Ética al servicio de la salud





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2025-29538409-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Marzo de 2025

Referencia: PROSPECTO PROD. DIOXAFLEX VL EX-2025-18570373- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.03.21 08:27:13 -03:00

Maria Laura Garcia
Profesional de la Salud
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.03.21 08:27:14 -03:00